

Comentarios al caso clínico de fracturas de escafoides

Se trata de un caso típico de fractura de escafoides, no detectada en su momento, que recibió un tratamiento sintomático con lo que cedió el dolor y requirió una revaloración tres meses después por persistencia de la incapacidad funcional residual. La proyección AP de muñeca muestra una fractura de escafoides en el tercio medio de su cuerpo con reabsorción de sus bordes y con discreta esclerosis; se observa un desplazamiento > 1 mm. No hay acortamiento del hueso, no se aprecian otras fracturas y en la proyección lateral se observa el carpo alineado sin datos de DISI.

ID: Fractura de escafoides en su tercio medio, desplazada con retardo en la consolidación.

Tratamiento propuesto: Reducción abierta, osteosíntesis y aporte osteogénico.

Pronóstico: Existe una alta posibilidad de consolidación pero es muy probable que evolucione con artrosis escaforradial en algunos años.

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN SOBRE FRAC- TURAS DE ESCAFOIDES

(Publicado en septiembre de 2007)

1 D	2 E	3 B	4 C
5 A	6 A	7 E	8 C
9 C	10 D	11 C	12 D
13 D	14 A	15 C	