

## Cuestionario de autoevaluación sobre tumores óseos

1. La fosfatasa ácida se eleva cuando existe:
  - a) Enfermedad de Paget
  - b) Osteosarcoma
  - c) Condroblastoma
  - d) Encondromatosis múltiple
  - e) Metástasis prostática
  
2. En la estadificación de Enneking, las siglas «T1» hacen referencia a:
  - a) Tumor intracompartmental
  - b) Tumor extracompartmental
  - c) Metástasis a distancia
  - d) Sin metástasis
  - e) Bajo grado de malignidad
  
3. El Grado 2 de Enneking hace referencia a:
  - a) Tumor benigno agresivo
  - b) Tumor maligno de baja agresividad
  - c) Alto riesgo de metástasis
  - d) Metástasis regional
  - e) Lesión extracapsular
  
4. Un tumor benigno común en la infancia que no requiere tratamiento es:
  - a) El osteocondroma
  - b) Quiste óseo unicameral
  - c) El condroma
  - d) El osteoma osteoide
  - e) El defecto fibroso
  
5. El tumor benigno más doloroso es:
  - a) El osteocondroma
  - b) Quiste óseo unicameral
  - c) El condroma
  - d) El osteoma osteoide
  - e) El defecto fibroso

6. Son tumores óseos de comportamiento agresivo:
  - a) El condroblastoma, el fibroma condromixoide y el TCG
  - b) El encondroma, el condroblastoma y el osteoma osteoide
  - c) El quiste óseo unicameral, el TCG y el defecto óseo cortical
  - d) El fibroma condromixoide, el TCG y el osteoma osteoide
  - e) El osteocondroma, el encondroma y el TCG
7. Cuando un fibroma condromixoide no se legra adecuadamente y no se rellena tiene un riesgo de recidiva de:
  - a) 20%
  - b) 30%
  - c) 50%
  - d) 80%
  - e) Nunca recidiva
8. El TCG está considerado como un tumor benigno agresivo porque generalmente tiene un crecimiento extracompartmental, involucrando con frecuencia los siguientes tejidos, EXCEPTO:
  - a) Músculos que lo rodean
  - b) Fascias
  - c) Tendones a su alrededor
  - d) Vasos periféricos
  - e) Huesos vecinos
9. El diagnóstico diferencial de un TCG debe hacerse principalmente con:
  - a) Quiste óseo aneurismático, condroblastoma, condrosarcoma de células claras
  - b) Defecto fibroso, condroblastoma, fibroma condromixoide
  - c) Condroblastoma, quiste óseo unicameral y osteosarcoma
  - d) Con osteomielitis crónica, quiste aneurismático y osteoma osteoide
  - e) Condrosarcoma, osteosarcoma y quiste aneurismático
10. ¿Cuál de las siguientes técnicas de diagnóstico es la menos adecuada ante la sospecha de un tumor maligno?
  - a) La radiografía simple
  - b) La resonancia magnética
  - c) PET
  - d) La biopsia con aguja gruesa
  - e) Biopsia excisional

11. Ante un tumor óseo maligno, los requisitos para realizar un rescate son todos los siguientes, *EXCEPTO*:
- a) Esqueleto maduro o en etapa final del crecimiento
  - b) Respuesta adecuada a la quimioterapia
  - c) Metástasis
  - d) Necrosis tumoral extensa
  - e) Desplazamiento del paquete neurovascular
12. Posterior a una amputación por un tumor óseo maligno, la mayor utilidad de la quimioterapia:
- a) Evitar la recidiva
  - b) Disminuir el dolor
  - c) Evitar la diseminación del tejido neoplásico por vía vascular
  - d) Controlar la enfermedad metastásica
  - e) No está indicada
13. La quimioterapia está contraindicada cuando:
- a) El tumor es extracompartimentales
  - b) El paciente se encuentra en fase terminal
  - c) Se ha efectuado cirugía radical
  - d) Se ha efectuado una cirugía de rescate
  - e) Existe metástasis pulmonar
14. En el tratamiento del sarcoma osteogénico, cuál de los siguientes procedimientos está contraindicado:
- a) La radioterapia
  - b) La quimioterapia
  - c) La cirugía de rescate
  - d) La biopsia con aguja gruesa
  - e) La resección en bloque
15. La radioterapia en pacientes con fisis abiertas:
- a) Está totalmente contraindicada
  - b) Es preferible a la quimioterapia
  - c) Puede afectar el crecimiento
  - d) Sólo debe aplicarse preoperatoriamente
  - e) Se usa para el control de metástasis

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN SOBRE CONTROL DEL DAÑO EN EL PACIENTE POLITRAUMATIZADO, PUBLICADO EN ORTHOTIPS, VOL. 4, NO. 1. MARZO 2007.

- |      |      |       |       |
|------|------|-------|-------|
| 1. e | 5. e | 9. d  | 13. a |
| 2. a | 6. a | 10. b | 14. e |
| 3. c | 7. b | 11. e | 15. c |
| 4. b | 8. d | 12. d |       |