

**Colegio de Médicos Postgraduados IMSS, A.C.**

"EL FUTURO ES HOY"

XXXIV JORNADA MÉDICA NACIONAL Y XVIII SIMPOSIUM INTERNACIONAL

Febrero 9, 10 y 11 de 2006

Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI

**EPIDEMIOLOGÍA DEL ABSCESO HEPÁTICO EN UN HOSPITAL GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

ZAVALA PINEDA MANUELITA, **GÓMEZ HERNÁNDEZ GREGORIO**, MENDOZA VILLEGAS MARICELA.

Unidad de Medicina Interna e Infectología, Hospital General de México. México, D. F.

**Objetivo:** Describir las características epidemiológicas de pacientes con absceso hepático tratados en el Hospital General de México.

**Material y métodos:** Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y longitudinal. Se revisaron 118 expedientes de pacientes que ingresaron a los servicios de Infectología y Medicina Interna, con diagnóstico de absceso hepático en el periodo 2000-2004. Se integraron 3 grupos de pacientes de acuerdo a etiología del absceso hepático: a) amebiano, b) piógeno y c) mixto. El análisis estadístico se realizó con distribución de frecuencias y porcentajes.

**Resultados:** De 118 expedientes, 80 cumplieron con los criterios diagnósticos a revisar, 71% correspondió al sexo masculino y 29% al femenino. Los grupos de edad afectados fueron: de 20 a 50 años 64%, mayores de 50 años 29%, y menores de 20 años 6%. 45% provenía de área rural, 37% de suburbana y 18% de áreas urbanas. La incidencia de casos se observó en marzo-abril y octubre-noviembre. Enfermedades concomitantes encontradas: alcoholismo crónico 55%, anemia 8%, desnutrición 4%, tuberculosis, hepatitis C, infección por VIH y colecistitis crónica 3%. De acuerdo a etiología: 59% fue origen amebiano, 35% piógeno y 6% mixto. Localización: 72% de los abscesos lóbulo hepático derecho; 21% lóbulo izquierdo y 8% en ambos. Complicaciones: derrame pleural 23%, apertura de absceso hepático a pleura 4%, apertura a cavidad abdominal 3%, apertura a bronquios 2%. Todos los pacientes sobrevivieron.

**Conclusiones:** En nuestro ambiente *Entamoeba histolytica* es el principal agente causal de absceso hepático. La asociación de alcoholismo crónico con esta patología es muy frecuente. La incidencia de casos fue mayor en marzo-abril y octubre-noviembre. El comportamiento clínico y de laboratorio es similar al mencionado en la literatura mundial.

FECHA	30 de diciembre de 2005	CARTEL N°:	
DATOS PARA LOCALIZAR AL AUTOR			
NOMBRE	GOMEZ	HERNANDEZ	GREGORIO
	<small>APELLIDO PATERNO</small>	<small>APELLIDO MATERNO</small>	<small>NOMBRE(S)</small>
DIRECCIÓN:	TETELA DEL ORO 27	VALLE GOMEZ	15210
	<small>CALLE Y NUMERO</small>	<small>COLONIA</small>	<small>C.P.</small>
	VENUSTIANO CARRANZA	MEXICO	D. F.
	<small>DELEGACION O MUNICIPIO</small>	<small>CIUDAD</small>	<small>ESTADO</small>
	57593371	gregoriosm@hotmail.com	
	<small>TELEFONO(S)</small>	<small>E-MAIL</small>	
MÉDICO RESIDENTE	<input type="radio"/>	MÉDICO DE BASE	<input type="radio"/>
MÉDICO DE CONFIANZA	<input type="radio"/>	FIRMA	