

Colegio de Médicos Postgraduados IMSS, A.C.

"EL FUTURO ES HOY"

XXXIV JORNADA MÉDICA NACIONAL Y XVIII SIMPOSIUM INTERNACIONAL

Febrero 9, 10 y 11 de 2006

Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI

TRATAMIENTO POR CIRUGÍA LAPAROSCOPICA DE LA ENFERMEDAD POR REFLUJO CON LA FUNDUPLICATURA POSTERIOR SIN FIJACIÓN DEL FUNDUS GÁTRICO AL LADO IZQUIERDO DEL ESOFAGO.

Olguín Juárez P, Díaz De León Ponce G, Hernández Reyes F, Contla Linares S. Servicio de Cirugía General del Hospital General de Zona No. 27 Tlatelolco, "Dr. Alfredo Badallo García"

Introducción: El tratamiento con cirugía de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) produce cierto grado de disfagia, y en el caso de la funduplicatura Nissen se agrega dificultad para eructar; por lo que ahora con la cirugía laparoscópica se intentan técnicas que eviten estas complicaciones.

Objetivo: Determinar que la funduplicatura posterior sin fijación del fundus al lado izquierdo del esófago, disminuye la disfagia y evita el reflujo gastroesofágico comparada con la técnica quirúrgica de Nissen en pacientes adultos.

Diseño: Ensayo clínico controlado.

Material y Métodos: Se estudiaron 33 pacientes adultos con ERGE programados para cirugía laparoscópica. Mediante una tabla de números aleatorios se operaron 16 con hemifunduplicatura sin fijación del fundus gástrico al lado izquierdo del esófago (HSFFGIE) (grupo 1) y 17 con técnica de Nissen (grupo 2). Se uso la clasificación modificada de Savary Millar para la evaluación endoscópica de esofagitis y la clasificación de Visick para medir la sintomatología a los 30 días del postoperatorio. El paciente y el evaluador estaban cegados a la maniobra experimental. Prueba estadística U Mann-Whitney.

Resultados: El grupo 1 con edad 53.88 ±15.99 años; 27.3% mujeres, 21.2% hombres.

Grupo 2: 50.3±15.38 años; 45.5% mujeres, 6.1% hombres. No se observó diferencia en el grado de esofagitis. La sintomatología postoperatoria fue menor en el grupo 1 con media de rangos 13.88 y en el grupo 2 de 19.84 p= 0.02.

Conclusión: La hemifunduplicatura sin fijación del fundus gástrico al lado izquierdo del esófago tiene menos sintomatología postoperatoria en el tratamiento del ERGE

FECHA	30 diciembre 2005	CARTEL N°:	
DATOS PARA LOCALIZAR AL AUTOR			
NOMBRE	OLGUIN	JUAREZ	PEDRO
	<small>APELLIDO PATERNO</small>	<small>APELLIDO MATERNO</small>	<small>NOMBRE(S)</small>
DIRECCIÓN: AV. CUAUHTEMOC	893-5	NARVARTE	03020
	<small>CALLE Y NUMERO</small>	<small>COLONIA</small>	<small>C.P.</small>
BENITO JUAREZ	MEXICO D. F.	MEXICO D.F.	
	<small>DELEGACION O MUNICIPIO</small>	<small>CIUDAD</small>	<small>ESTADO</small>
5686 8649	olguinjuarezp@tutopia.com		
	<small>TELEFONO(S)</small>	<small>E-MAIL</small>	
MÉDICO RESIDENTE <input type="radio"/>	MÉDICO DE BASE <input type="radio"/>	MÉDICO DE CONFIANZA <input type="radio"/>	FIRMA