

Colegio de Médicos Postgraduados IMSS, A.C.

"EL FUTURO ES HOY"

XXXIV JORNADA MÉDICA NACIONAL Y XVIII SIMPOSIUM INTERNACIONAL

Febrero 9, 10 y 11 de 2006

Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI

RESUMEN.

Utilidad de la ligadura de arterias hipogástricas comparada con histerectomía en pacientes con hemorragia obstétrica.

Dra. López Rodríguez Brenda Leticia. Dr. José Antonio Páez Angulo. Dra. María de los Angeles Guzmán Ibarra.

OBJETIVO. Analizar la utilidad de la ligadura de arterias hipogástricas comparada con la histerectomía en el tratamiento de hemorragia obstétrica.

MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio de retrospectivo, transversal, observacional, comparativo, de casos consecutivos. En pacientes con hemorragia obstétrica que no respondieron a tratamiento médico y que se empleó histerectomía obstétrica con o sin ligadura de arterias hipogástricas y ligadura de arterias hipogástricas se obtuvieron: días de estancia intrahospitalaria, hemorragia transoperatoria, reintervenciones, y se compararon. Se emplearon frecuencias, porcentajes e IC 95% media, mediana y moda con desviación estándar, estadística inferencial X^2 de Mantel y Haecnzal.

RESULTADOS. Se analizaron 52 pacientes. Los días de estancia del total fue de 5.9 días, y desviación estándar de 3.18. Sin significancia estadística para los días de estancia.

La hemorragia transoperatoria en promedio por grupo completo fue de 1541.35 ml, mínimo de 200 ml y máximo de 3200 ml, desviación estándar de 845.73 ml

El valor de $p=0.00$ para la diferencia entre los grupos a favor de la ligadura de hipogástricas.

El porcentaje de reintervenciones por grupo completo fue de: 10 pacientes (19.2%) con una reintervención, de 2 reintervenciones, 1 pacientes (1.9%) y ninguna reintervención fueron 41 pacientes (78.8%).

El valor de $p= 0.549$ no fue estadísticamente significativo para la diferencia entre la cantidad de sangrado de los grupos.

CONCLUSIONES.

La ligadura de arterias hipogástricas, es una técnica quirúrgica efectiva en pacientes con hemorragia obstétrica.

La hemorragia transoperatoria fue menor en pacientes con ligadura de arterias hipogástricas como único procedimiento sin reintervenciones.

FECHA	15-dic-2005	CARTEL N°:	
DATOS PARA LOCALIZAR AL AUTOR			
NOMBRE <u>Dr. José Antonio Páez Angulo</u> .			
<small>APELLIDO PATERNO</small>		<small>APELLIDO MATERNO</small>	
<small>NOMBRE(S)</small>			
DIRECCIÓN: AV. VALLEJO Y ANTONIO VALERIANO COL. LA RAZA			
<small>CALLE Y NUMERO</small>		<small>COLONIA</small>	
<small>C.P.</small>			
AZCAPOTZALCO MEX. DF.		DF.	
<small>DELEGACION O MUNICIPIO</small>		<small>CIUDAD</small>	
<small>ESTADO</small>			
57245900 EXT.23707			
<small>TELEFONO(S)</small>		<small>E-MAIL</small>	
<input type="radio"/> Medico de Base		<input type="radio"/>	
<small>FIRMA</small>			