

Colegio de Médicos Postgraduados IMSS, A.C.

"EL FUTURO ES HOY"

XXXIV JORNADA MÉDICA NACIONAL Y XVIII SIMPOSIUM INTERNACIONAL

Febrero 9, 10 y 11 de 2006

Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI

PREVALENCIA DE COMPLICACIONES Y COMPORTAMIENTO HEMODINÁMICO EN PACIENTES SOMETIDOS A RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA DE ACUERDO AL TIPO DE ANESTESIA

Espíndola Flores BF*, Vásquez Márquez PI, **Castellanos Olivares A.** Servicios de Anestesiología y Educación e Investigación en Salud, Hospital de Especialidades CMN Siglo XXI

INTRODUCCION. El tratamiento de la Hipertrofia prostática se realiza con mayor frecuencia mediante la Resección Transuretral de Próstata (RTUP). Este procedimiento tiene una morbilidad baja de 0.2-6%.

OBJETIVO. Conocer las prevalencia de complicaciones transoperatorias en sujetos sometidos a RTUP

MATERIAL Y METODOS. Se estudiaron 177 caso de pacientes sometidos a RTUP en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional siglo XXI, en los años de 2002 y 2003. Se reviso la valoración por anestesia y medicina interna, hoja de procedimientos anestésico y quirúrgico, hojas de anestesia y cirugía, de ingreso y egreso de recuperación y notas de evolución; ingresando esta información en una hoja de recolección de datos para capturarla finalmente en una base de datos mediante un paquete estadístico (SPSS).

RESULTADOS. De los 177 pacientes incluidos en el estudio 140 fueron manejados con BPD y 31 con AGB. El ASA que se encontró con más frecuencia fue el ASA 2, el promedio de edad fue de 69 ± 10 años, peso 72 ± 10 kg. , tiempo anestésico de 157 ± 43 min. Las complicaciones que se presentaron en orden de frecuencia fue: ansiedad en 40 pacientes, náuseas en 31 pacientes, disrritmias en seis pacientes, isquemia la miocardio y bacteremia un caso, Postanestésicas: septicemia 24 pacientes, retención urinaria 4 pacientes, atelectasia e isquemia al miocardio un paciente respectivamente. El promedio de permanencia de la sonda vesical fue de 7 y 8 días. Los cambios hemodinámicas fueron más notorios en los pacientes manejados con AGB.

CONCLUSIONES Las complicaciones transoperatorias más frecuentes fueron la ansiedad y el estado nauseoso. En el postoperatorio predominó la septicemia.

FECHA			CARTEL N°:			
DATOS PARA LOCALIZAR AL AUTOR						
NOMBRE	Castellanos	Olivares	Antonio			
	<small>APELLIDO PATERNO</small>	<small>APELLIDO MATERNO</small>	<small>NOMBRE(S)</small>			
DIRECCIÓN:	Av. Cuauhtmoc No. 330	Doctores	0 6720			
	<small>CALLE Y NUMERO</small>	<small>COLONIA</small>	<small>C.P.</small>			
	Cuautemoc	México D. F	México.			
	<small>DELEGACION O MUNICIPIO</small>	<small>CIUDAD</small>	<small>ESTADO</small>			
	56276900 Ext. 21 607	isidoc@avantel.net				
	<small>TELEFONO(S)</small>	<small>E-MAIL</small>				
MÉDICO RESIDENTE	<input type="radio"/>	MÉDICO DE BASE	<input type="radio"/>	MÉDICO DE CONFIANZA	<input type="radio"/>	FIRMA