

Colegio de Médicos Postgraduados IMSS, A.C.

"EL FUTURO ES HOY"

XXXIV JORNADA MÉDICA NACIONAL Y XVIII SIMPOSIUM INTERNACIONAL

Febrero 9, 10 y 11 de 2006

Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI

PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO QUE FAVORECEN LA NO LACTANCIA MATERNA. JOSE RICARDO CAMACHO HERNÁNDEZ. Departamento de Epidemiología. Unidad de Medicina Familiar No. 55. IMSS-PUEBLA.

OBJETIVO: Estimar la fuerza de asociación de los factores de riesgo que favorecen la no Lactancia Materna en población usuaria a la UMF No 55 del IMSS-Puebla.

MATERIAL Y METODOS.- Se realizó un estudio observacional descriptivo, transversal de prevalencia, del 30 de junio del año 2000 al 30 de Agosto del año 2005 en la unidad de medicina familiar No. 55 del IMSS-Puebla. Se estudiaron a mujeres derechohabientes-usuarias con hijo menor a 1 año de edad y que aceptara participar en el estudio contestando el cuestionario. Criterios de exclusión: Femeninos que no acepten contestar el cuestionario, el cual incluyó variables socioeconómicas y de probable factores de riesgo. Los criterios de Eliminación: Cuestionarios incompletos. Se realizó análisis Univariado y bivariado; para determinar la fuerza de asociación se calculó la razón de momios de prevalencia e intervalos de confianza al 95%, y para la significancia estadística se utilizó la "Ji" de Mantel y Heanzel.

RESULTADOS.- Se estudiaron a 2124 mujeres de las cuales 198 no proporcionaron seno materno a su hijo para una prevalencia de 9.32 %; de estas, 32 (16.2 %) fué por carecer de leche materna, 12 (6.0 %) por presentar dolor en la glándula mamaria, y 127 (64.1 %) por ser madre trabajadora. La media de edad de las mujeres que no lactaron a su "bebe" fué de 26.98 con una DS de 5.10 años.

Del total de la población: el 27.96 % (594) fueron mujeres menores de 20 años de edad; el 48.58 % (1032) se dedicaban al trabajo comercial; el 40.82 % (867) fueron solteras o madres solteras.

El presentar una edad menor a 20 años presentó una RMP del 1.31 (IC al 95 % 0.87-1.98; p= 0.181); el ser madre trabajadora presentó una RMP de 2.87 (IC al 95 % 2.06-4.01; p=0.0000); el ser madre soltera con una RMP de 7.01 (IC al 95 % 4.82-10.25; p=0.00000); el tener una escolaridad menor a bachiller con una RMP de 2.07 (IC al 95 % 1.46-2.93; p= 0.00001); en atención prenatal, al presentar menos de 9 consultas con una RMP de 5.27 (IC al 95 % 2.49-11.64; p= 0.00000); y, el que no se dé información sobre el tema de lactancia materna por personal de salud con una RMP de 2.94 (IC al 95 % 1.68-5.11; p= 0.00002).

CONCLUSIONES.- Las razones expuestas por las madres para no amamantar a sus hijos son en orden de frecuencia: ser madre trabajadora, no tener leche materna suficiente, dolor en el pecho y porque perdía su figura.

La fuerza de asociación encontrada fué en: ser madre trabajadora, madre soltera, madre con escolaridad menor a bachiller, madre con menos de 9 consultas prenatales y madre a la cual no se le proporcionó información sobre lactancia materna por el personal de salud.

Los riesgos calculados en esta muestra probablemente no representan al 100 % de la población de madres, pero nos sirve como indicador para efectuar actividades en bien de la población infantil.

FECH			CARTEL N°:	
DATOS PARA LOCALIZAR AL AUTOR				
NOMBRE	CAMACHO	HERNÁNDEZ	JOSÉ RICARDO	
	<small>APELLIDO PATERNO</small>	<small>APELLIDO MATERNO</small>	<small>NOMBRE(S)</small>	
DIRECCIÓN:				
	<small>CALLE Y NÚMERO</small>	<small>COLONIA</small>	<small>C.P.</small>	
	<small>DELEGACION O MUNICIPIO</small>	<small>CIUDAD</small>	<small>ESTADO</small>	
	<small>TELÉFONO(S)</small>	<small>E-MAIL</small>		
MÉDICO RESIDENTE <input type="radio"/>	MÉDICO DE BASE <input type="radio"/>	MÉDICO DE CONFIANZA <input type="radio"/>	FIRMA	