

Colegio de Médicos Postgraduados IMSS, A.C.

"EL FUTURO ES HOY"

XXXIV JORNADA MÉDICA NACIONAL Y XVIII SIMPOSIUM INTERNACIONAL

Febrero 9, 10 y 11 de 2006

Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI

TITULO:

APLICACIÓN DE INDICADORES ANTROPOMETRICOS QUE PERMITAN DESCARTAR DESNUTRICION EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, DEL PROGRAMA DEL DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES, EN LOS MÓDULOS DE OCOTLÁN Y ZIMATLÁN, OAX.

AUTORES:

Dra. TERESITA DEL ROSARIO PAZ LOPEZ SUPERVISOR MEDICO IMSS OPORTUNIDADES
DR. ANDRES JORGE JARQUIN ORTIZ COORD. DELEG. ATENCIÓN MEDICA 1er NIVEL IMSS ORD.

TITULO:

APLICACIÓN DE INDICADORES ANTROPOMETRICOS QUE PERMITAN DESCARTAR DESNUTRICION EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, DEL PROGRAMA DEL DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES, EN LOS MÓDULOS DE OCOTLÁN Y ZIMATLÁN, OAX.

INTRODUCCION

La desnutrición energético-proteinica se relaciona con los fenómenos sociales y culturales que caracterizan a una nación, a una colectividad y a una familia. El estado de nutrición está determinado por factores ambientales, genéticos, neuroendocrinos y por el momento biológico en el que se encuentra un individuo. La desnutrición es un estado patológico, inespecífico, se origina, como resultado de la deficiente incorporación de los nutrimentos a las células del organismo, y se presenta con diversos grados de intensidad y variadas manifestaciones clínicas de acuerdo con factores ecológicos"

OBJETIVO: Efectuar un diagnostico adecuado de desnutrición energético proteica (DEP), en los niños menores de 5 años, del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

MATERIAL Y METODOS:

Es un estudio descriptivo, prospectivo, transversal y observacional. Participaron 302 niños menores de 5 años del programa de Desarrollo Humano Oportunidades de los módulos de Ocotlán y Zimatlán, Oax.

RESULTADOS: para el indicador de Gómez peso/edad, se obtuvo un resultado de 205 niños normales siendo un 68.4%; 43 desnutrición leve 14.2%, desnutrición moderada 0.5%, sobrepeso 38 (12.5%), obesidad 13 (4.3%). En cuanto al indicador de Waterlow peso/estatura niños normales 223 (74%), desnutrición leve 31 (10.2%), desnutrición moderada 9 (2.9%), sobrepeso 30 (10%), obesidad 9 (2.9%). En el indicador de Waterlow estatura/edad 223 niños fueron normales (74%), 34 ligeramente baja (11.2%), 7 estatura baja (2.3%), ligeramente alta 31 (10.2%), alta 7 (2.3%). En relación a la evaluación global subjetiva 251 (83%) niños resultaron normales, 49 (16.2%) con desnutrición leve y 2 con desnutrición moderada (0.6%) En relación al tipo de alimentación por grupos de alimentos y recordatorio de 24 horas, el 82% tienen una alimentación regular y el 18% una alimentación deficiente.

CONCLUSIONES:

Para efectuar una evaluación nutricional en los menores de 5 años: los mejores indicadores son los de Waterlow, correlacionados con la evaluación global subjetiva

FECHA			CARTEL N°:	
DATOS PARA LOCALIZAR AL AUTOR				
NOMBRE	PAZ	LOPEZ	TERESITA DEL ROSARIO	
	<small>APELLIDO PATERNO</small>	<small>APELLIDO MATERNO</small>	<small>NOMBRE(S)</small>	
DIRECCIÓN:				
	<small>CALLE Y NUMERO</small>	<small>COLONIA</small>	<small>C.P.</small>	
	<small>DELEGACION O MUNICIPIO</small>	<small>CIUDAD</small>	<small>ESTADO</small>	
	<small>TELEFONO(S)</small>	<small>E-MAIL</small>		
MÉDICO RESIDENTE <input type="radio"/>	MÉDICO DE BASE <input type="radio"/>	MÉDICO DE CONFIANZA <input type="radio"/>	FIRMA	