

ICONOGRAFÍA COLPOSCÓPICA DE UN EXPERTO

Dr. Santiago Dexeus



Hay personas que tienen un espíritu indomable que las convierte en especiales. Uno de esos casos es el del Profesor Santiago Dexeus, uno de los ginecólogos más prestigiosos del mundo. Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, Director del Departamento de Obstetricia y Ginecología del “Instituto Universitario Dexeus”, Expresidente de la “International Federation of Cervical Pathology and Colposcopy”.

Autor de numerosos libros entre los que mencionaremos: “Tratado y Atlas de Colposcopia” (1973, 1977, 1986) y “Tratado y Atlas de Patología Cervical” (1989, 1993). Como coautor en: “Patología y Tratamiento del tracto genital inferior” (Giuseppe De Palo, William Chanen y Santiago Dexeus; 2000). Miembro del Comité Editorial de revistas científicas nacionales e internacionales, ha escrito más de 200 artículos científicos y 31 capítulos de libro.

Las actividades profesionales que el Dr. Santiago Dexeus ha desempeñado, además de fructíferas, se destacan por la incansable e importante labor docente que ha brindado en su país y fuera de él. Actualmente, funda él: Centro Ginecológico Santiago Dexeus, continuando con la misma vocación asistencial, docente y científica, internacionalmente reconocidas.




FIGURA 1. HALLAZGOS COLPOSCOPICOS NORMALES.

Imagen colposcópica de un cuello normal donde se observa: Epitelio escamoso original, epitelio columnar (ectopia) y zona de transformación (con presencia de islotes de ectopia y orificios glandulares).




FIGURA 2. EPITELIO ACETOBLANCO en labio anterior con mosaico regular. Cambios menores.




FIGURA 3. Epitelio acetoblanco denso y de bordes nítidos. Cambios mayores.



FIGURA 4. Punteado grueso e irregular en un epitelio intensamente acetoblanco. Cambios mayores.



FIGURA 5. Mosaico extenso e irregular, con losetas de diferentes tamaños. Cambios mayores



FIGURA 6. VIN tipo común - Relacionado con la infección por VPH. Suele presentarse en mujeres jóvenes. El aspecto clínico se caracteriza por múltiples lesiones sobreelevadas de color blanco o pigmentadas, localizadas preferentemente en el tercio inferior de la vulva.