

<i>Primer autor</i>	<i>Procedencia</i>	<i>Título del trabajo</i>
Acoltzin-Vidal C	Colima, Col.	Comportamiento del índice RDT/ST ante trastorno de conducción interventricular
Acoltzin-Vidal C	Colima, Col.	Comportamiento del índice RDT/ST en casos c de qtc corto comparado con qtc normal
Acoltzin-Vidal C	Colima, Col.	Distribución de valores del índice RDT/ST en muestra representativa de la población de referencia
Aguilar LCE	Guadalajara, Jal.	Calidad de la atención cardiológica, apego a las guías en sica
Aguilar-Espinosa F	Guadalajara, Jal.	Índice aterogénico en sujetos con hipertensión arterial sistémica en Hospital Privado de Zapopan
Alba-Leonel A	México, D.F.	Hipertensión arterial: una década en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, México 2008
Albarrán DJ	Aguascalientes, Ags.	Lesiones del ostium de la coronaria derecha tratadas por angioplastia coronaria transluminal percutánea
Almeida GE	México, D.F.	Pronóstico de la evaluación ecocardiográfica de la interdependencia ventricular en pacientes con infarto agudo del miocardio
Almeida-Gutiérrez E	México, D.F.	Valor pronóstico de la función ventricular diastólica izquierda evaluada ecocardiográficamente en pacientes con primer infarto agudo del miocardio con elevación del ST
Araiza-Guerra A	León, Gto.	Mixoma recidivante de aurícula izquierda. Reporte de un caso
Asencio OR	Guadalajara, Jal.	Dosis alta de clopidogrel en pacientes con intervención coronaria percutánea
Baena SE	Monterrey, N.L.	Prótesis endovasculares medicadas y de metal en la angioplastia primaria, reporte de un Centro Hospitalario en México
Baltazares-Lipp ME	México, D.F.	Colocación de filtro en vena cava inferior en pacientes con tromboembolia pulmonar
Baltazares-Lipp ME	México, D.F.	Manejo quirúrgico de tromboembolia pulmonar. Experiencia en el INER
Baltazares-Lipp ME	México, D.F.	Tratamiento intervencionista para hemoptisis masiva. Experiencia en el INER
Baltazares-Lipp ME	México, D.F.	Tromboembolia pulmonar masiva tratada con trombólisis. Experiencia en el INER
Bazaldúa SF	México, D.F.	Características clínicas y angiográficas de los pacientes con enfermedad aterosclerosa del tronco coronario izquierdo
Bonilla U	México, D.F.	Válvula Starr Edwards normofuncionante después de 35 años. Reporte de caso
Borrayo SG	México, D.F.	Papel de interleucina-6 en el fenómeno de «no-reflow» en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST tratados con angioplastia primaria
Borrayo SG	México, D.F.	Pronóstico de las estrategias de reperfusión en pacientes con infarto agudo de miocardio inferior con involucro del ventrículo derecho
Borrayo SG	México, D.F.	Registro nacional de síndromes coronarios agudos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Renasca-IMSS, primer informe
Borrayo SG	México, D.F.	Espectro clínico del síndrome coronario agudo en pacientes de edad avanzada en la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares
Borrayo SG	México, D.F.	Factores pronósticos en pacientes > 65 años con infarto agudo de miocardio con elevación del ST
Borrayo SG	México, D.F.	Pronóstico de interleucina 6 en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST
Campos V	México, D.F.	Marcapasos submamarios en mujeres jóvenes
Casas JUT	Aguascalientes, Ags.	Evaluación clínica y ecocardiográfica a un año en pacientes sometidos a valvuloplastia aórtica de rescate por estenosis aórtica severa
Castro-Villacorta H	México, D.F.	Comparación de los parámetros al implante entre electrodos ventriculares colocados en tracto de salida contra ápex de ventrículo derecho
Ceballos DM	México, D.F.	Ablación con frío vs radiofrecuencia
Ceballos DM	México, D.F.	Ablación guiada con cartografía electroanatómica («localisa»)
Ceballos RG	México, D.F.	Análisis del efecto de la inhibición de la 5 α reducción con finasterida en el daño inducido por testosterona en el daño miocárdico inducido por isquemia-reperfusión coronaria en ratas
Chávez QFJ	Guadalajara, Jal.	Enfermedad de pompe de inicio infantil: revisión y presentación de caso clínico
Chávez QFJ	México, D.F.	Indicación, seguimiento, factores de riesgo, complicaciones y mortalidad de 260 pacientes con cateterismo cardiaco del Hospital Civil de Guadalajara del periodo de marzo de 2005 a septiembre de 2007
Colorado LJA	Monterrey N.L.	Angioplastia coronaria con stent en mujeres ¿existe diferencia en los resultados comparado con el grupo de hombres? experiencia en la UMAE 34

Colorado LJA	Monterrey, N.L.	Angioplastia coronaria con stent en mayores de 75 años ¿existe diferencia en los resultados comparado con el grupo de menor edad?
Constantino E	México, D.F.	Mixoma gigante recidivante de ventrículo derecho. Reporte de un caso
Contreras OJ	México, D.F.	Valvuloplastia aórtica en embarazo, reporte de un caso y revisión de la bibliografía
Cortés MJ	México, D.F.	Resultados de la clínica de tabaquismo en el Hospital de Cardiología
Cortés NE	España	Comparación de parámetros Doppler entre deportistas y sedentarios sanos
Cortés NEA	España	Experiencia en el intervencionismo coronario percutáneo urgente en un hospital con servicio de hemodinamia de 24 h
Cortés NEA	España	Análisis del intervencionismo coronario percutáneo con dispositivo de aspiración de trombo y protección proximal versus dispositivo de aspiración convencional
Cortés NEA	España	Angioplastia coronaria primaria en pacientes en shock cardiogénico. Resultados iniciales y seguimiento a largo plazo
Cortés NEA	España	Efecto de la instauración de un programa de angioplastia primaria en los tiempos de aplicación del intervencionismo coronario
Cortés NEA	España	Resultados iniciales y seguimiento a largo plazo de pacientes con contraindicación para fibrinólisis tratados con angioplastia coronaria primaria
Cortés NEA	España	Vía de abordaje en el intervencionismo coronario percutáneo primario
Cortés Ríos AJ	México, D.F.	Sobrevida intrahospitalaria y a un año en pacientes mayores de 88 años sometidos a coronariografía en el Centro Médico ABC
Cruz R	León, Gto.	¿La escala de Parssonet puede predecir la mortalidad en pacientes con cirugía cardiaca de manera confiable?
Cruz-Cervantes J	León, Gto.	Garantía de calidad en cirugía cardiovascular. Experiencia en una unidad médica de alta especialidad
Cubias AR	México, D.F.	Trombosis de prótesis valvulares cardiacas del lado izquierdo. ¿es la trombólisis o la cirugía la mejor opción de manejo?
Dávila E	México, D.F.	Intervención coronaria percutánea en choque cardiogénico
De Haro LS	México, D.F.	Marcadores de riesgo para eventos de taquiarritmias ventriculares en un grupo de pacientes con miocardiopatía dilatada
De La Torre N	Guadalajara, Jal.	Oclusión de vena subclavia secundaria a catéter de hemodiálisis. Manejo con intervención percutánea
Estrada AH	México, D.F.	Quilopericardio secundario a síndrome de vena cava superior en paciente nefrótica en hemodiálisis con fístula arteriovenosa y revisión de la literatura
Fernández VE	Guadalajara, Jal.	Angioplastia con protección distal en puentes de safena antiguos
Ficker LGB	Monterrey, N.L.	Comisurotomía mitral percutánea: resultados inmediatos, tardíos y factores de riesgo de reestenosis
Ficker LGB	Monterrey, N.L.	Diferencias del género sobre la mortalidad intrahospitalaria en pacientes sometidos a angioplastia primaria por un infarto agudo del miocardio: Reporte de un centro hospitalario
Frutos RE	Guadalajara, Jal.	Tratamiento de la trombosis intrastent
Fuantes DML	Aguascalientes, Ags.	Prevalencia de enfermedad arterial carotídea en pacientes con cardiopatía isquémica
Galván GJE	Monterrey, N.L.	Angioplastia primaria en pacientes con infarto agudo del miocardio complicado con choque cardiogénico: resultados intrahospitalarios
Galván GJE	Monterrey, N.L.	Experiencia en angioplastia renal percutánea: efecto de la creatinina sérica basal en la mortalidad a 30 días, 6 y 12 meses
Gaona CAJ	México, D.F.	Miocarditis, presentación clínica y diagnóstica con resonancia magnética
García RDE	México, D.F.	Función ventricular en pacientes en hemodiálisis crónica con fístula arteriovenosa
García y Otero A	Puerta de Hierro	Cierre de foramen ovale permeable con avc paradójico
García y Otero JM	Guadalajara, Jal.	Angioplastia carotídea con protección distal
García y Otero JM	Guadalajara, Jal.	Tratamiento del aneurisma aórtico abdominal con prótesis percutánea
Garibay GFJ	México, D.F.	Efectos de la terapia de resincronización cardiaca sobre los niveles de pnb e il-10 en pacientes con miocardiopatía dilatada
Gómez-Delgadillo S	México, D.F.	Disfunción por sobredetección de los desfibriladores automáticos implantables: reporte de un paciente pediátrico
González AE	México, D.F.	Correlación entre la escala de riesgo timi para síndrome coronario agudo sin elevación del segmento st y los hallazgos en la angiografía coronaria
González E	México, D.F.	Drenaje venoso pulmonar anómalo parcial cruzado
Gordillo-Moscoso A	España-México	Un infarto de miocardio reciente y no el nivel sérico de proteína c reactiva es el factor más importante en la predicción del desarrollo de complicaciones postquirúrgicas en pacientes sometidos a cirugía de revascularización coronaria
Guerra MF	Caracas, Venezuela.	Bloqueo auriculoventricular completo y marcapaso en niños
Hernández GMA	León, Gto.	Valor pronóstico del nivel de proteína C reactiva en la fase temprana de síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST

Hernández GMA	León, Gto.	Valor pronóstico del nivel de proteína C reactiva en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Resultados a largo plazo
Hernández MG	León, Gto	Anomalía de Uhl. Reporte de caso
Hernández TT	México, D.F.	Niveles críticos de fibrinógeno en pacientes con medicina nuclear de alto riesgo
Hernández-González M	León, Gto.	Análisis de riesgo de sangrado mayor en cirugía cardíaca con bomba de circulación extracorpórea
Hernández-González M	León, Gto.	Cirugía cardíaca sin bomba de circulación extracorpórea. Experiencia reciente en una unidad de alta especialidad
Hernández-González M	León, Gto.	Diferentes métodos de diagnóstico en las cardiopatías congénitas graves, una correlación con los hallazgos de cirugía
Hernández-González M	León, Gto.	Evaluación de la severidad de la estenosis valvular pulmonar mediante ecocardiograma y resonancia magnética por mapeo de flujo
Hernández-González M	León, Gto	Características ecocardiográficas en niños nefróticos con y sin sobrecarga de hierro
Hernández-González M	León, Gto	Comportamiento de la presión arterial sistémica en lactantes alimentados al seno materno
Hernández-González MA	León, Gto.	Resonancia magnética fetal y pentalogía de Cantrell
Hernández-González MA	León, Gto.	Diagnóstico del infarto agudo del miocardio en el diabético: una correlación electrocardiográfica-patológica
Hernández-Ledezma FU	León, Gto.	Instrumentación y uso de un dispositivo para medir actividad eléctrica de corazón y estómago
Isordia-Salas I	México, D.F.	Asociación del polimorfismo 4g/5g del pai-1 con infarto agudo de miocardio con elevación del ST en pacientes de < 45 años
Jiménez TO	Monterrey, N.L.	Experiencia en coartoplastia en un Hospital de Cardiología. Monterrey, NL. México
Jiménez TO	Monterrey, N.L.	Experiencia en el cierre percutáneo de defectos cardíacos congénitos en un Centro Cardiológico de Monterrey, NL. México
Justiniano S	México, D.F.	Rehabilitación cardíaca en el paciente adulto postoperado de cardiopatía congénita. Experiencia inicial y reporte de casos
Justiniano S	México, D.F.	Utilidad de la caminata de 6 min, en el paciente cardiópata pediátrico. Reporte de casos y experiencia inicial
Llamas-Esperón G	Aguascalientes, Ags.	Embolismo paradójico a arterias coronarias y cerebrales a través de un foramen oval permeable en un paciente con ozonoterapia intramuscular, resuelto por oclisor amplatzer
Llamas-Esperón G	Aguascalientes, Ags.	Prevalencia de enfermedad arterial periférica en miembros inferiores en pacientes con prueba de esfuerzo positiva para isquemia
López CB	Puerta de Hierro	Tratamiento de la reestenosis intrastent con stents liberadores de fármaco
López VP	México, D.F.	Manejo conservador de la estenosis aórtica severa congénita durante el embarazo, reporte de un caso y revisión de la literatura
López-Valenzuela P	León, Gto.	Mediastinitis aguda después de cirugía cardíaca. Reporte de casos
Lupercio MK	México, D.F.	Pronóstico del número de biomarcadores cardíacos en pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del ST
Madrid-Miller A	México, D.F.	Asociación del síndrome metabólico con la incidencia de complicaciones y severidad de la enfermedad arterial coronaria en pacientes con síndrome coronario agudo
Madrid-Miller A	México, D.F.	Hiperfibrinogenemia con factor de riesgo independiente en pacientes con angina inestable e infarto sin elevación del segmento ST
Meaney-Martínez A	México, DF.	Logrando las metas del NCEP: las enseñanzas del estudio cometa
Medellín MBJ	Monterrey, N.L.	El tratamiento percutáneo de la enfermedad iliaca en pacientes con enfermedad coronaria
Medellín MBJ	Monterrey, N.L.	Predictores de mortalidad en angioplastia de tronco coronario izquierdo
Medina-Moreno U	San Luis Potosí	Asociación entre factores de riesgo, número y activación plaquetaria en pacientes ateroscleróticos sometidos a cirugía de revascularización coronaria
Monroy SEN	Monterrey, N.L.	Nivel de creatinina sérica como predictor de complicaciones intrahospitalarias, en pacientes con cardiopatía isquémica, sometidos a angioplastia coronaria
Moratore C	Argentina	Características clínicas y evolución de las mujeres enroladas en el ICD Registry Latin America
Moreno MC	Guadalajara, Jal.	Diseción aórtica distal complicada manejada con prótesis endovasculares
Moreno RLA	México, D.F.	Impacto del tratamiento con bezafibrato en pacientes con hiperfibrinogenemia e infarto agudo del miocardio con elevación del ST
Muñoz-Sandoval MR	Aguascalientes, Ags.	Isquemia miocárdica en territorio de la coronaria derecha demostrado por gammagrama perfusorio, condicionado por una arteria coronaria izquierda única y corroborado por angiotomografía coronaria y angiografía
Núñez-Urquiza JP	Monterrey, N.L.	Acceso transradial en procedimientos cardiovasculares diagnósticos o terapéuticos
Olvera-Flores D	León, Gto.	Fístula coronaria izquierda con drenaje a aurícula derecha infectada, complicada con endocarditis aórtica
Ordóñez EG	México, D.F.	Correlación de la calidad de la imagen de perfusión miocárdica gammagráfica con sestamibi tc-99m más burbuja de aire gástrica
Ordóñez EG	México, D.F.	Uso de una burbuja gástrica para disminuir artefactos en estudios de perfusión miocárdica con sestamibi tc99m

Ordóñez EG	México, D.F.	Lesión pulmonar agudo en paciente postoperado de comunicación interauricular
Orendain GV	Guadalajara, Jal.	Uso de stents medicados en enfermedad vascular periférica
Orihuela RO	México, D.F.	Fracción de expulsión por ecocardiografía 3d y angiografía por radionucleótidos
Orihuela RO	México, D.F.	Función diastólica en pacientes con hipertiroidismo
Palacios RJM	México, D.F.	Angioplastia en el infarto agudo miocárdico: ¿Influye el género en los resultados? Reporte de un centro hospitalario en México. Resultados inmediatos y a 6 meses
Palacios RJM	Monterrey, N.L.	Stent renal en 220 pacientes portadores de estenosis vascular renal: experiencia de un centro hospitalario. Seguimiento a largo plazo
Palacios RJM	Monterrey, N.L.	Stent carotídeo en pacientes de alto riesgo: seguimiento a largo plazo
Palacios RJM	Nuevo León	Angioplastia primaria en pacientes $\geq$ de 75 años; reporte de un Centro Hospitalario en México
Palomo VJA	México, D.F.	Implante de un nuevo stent liberador de fármaco «drug start» en lesiones de novo
Pérez D	México, D.F.	Regresión de la interfase íntima-media carotídea con nifedipina cc vs hidroclorotiazida. Estudio reina
Pérez GJH	México, D.F.	Endocarditis
Pérez Vega A	México, D.F.	Resultados inmediatos y a 6 meses del tratamiento con reconstrucción arterial coronaria en pacientes con enfermedad difusa
Petersen AF	Guadalajara, Jal.	Angioplastia posttrombólisis en infarto agudo por vía radial
Pimentel G	México, D.F.	Resultados angiográficos inmediatos y seguimiento clínico de stents liberadores de fármaco (slf) en pacientes con cardiopatía isquémica, incluyendo pacientes con características clínicas o lesiones coronarias con mayor riesgo de reestenosis
Pimentel G	México, D.F.	Utilidad de los stents liberadores de fármacos en los pacientes con diabetes mellitus y cardiopatía isquémica. seguimiento clínico a largo plazo
Puente BA	México, D.F.	Isquemia miocárdica silente detectada mediante gated-spect (tomografía computarizada por emisión de fotón simple sincronizada con el electrocardiograma), en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. influencia de los niveles de proteína C reactiva de alta sensibilidad y hemoglobina glucosilada
Ramírez-Esquivel MA	México, D.F.	Punción transeptal vs acceso arterial femoral retrógrado para la ablación de las vías accesorias izquierdas
Real Noh E	México, D.F.	Evaluación de la recuperación de la frecuencia cardiaca postesfuerzo en sujetos clínicamente sanos
Reyes C	México, D.F.	Síndrome de Wilkie: una asociación rara a una patología cardiovascular común en nuestro medio
Reyes N	Puebla, Pue.	Técnica de punción axilar para el implante de marcapasos definitivos. Serie de casos
Reyes RN	Puebla, Pue.	Prevención primaria y secundaria de muerte súbita cardiaca. Registro latinoamericano de dai
Riera KC	México, D.F.	Miniesternotomía en el tratamiento de estenosis subvalvular por un diafragma subaórtico
Ríos CMA	México, D.F.	Electrodos ventriculares en septo: fijación activa vs pasiva
Rivera LA	León, Gto.	Análisis cardiovascular segmentario de van Praagh en cardiopatías congénitas. validación mediante cine-resonancia magnética cardiovascular
Rivero CD	Palma de Mallorca, Esp.	Comparación de parámetros de deformación y torsión entre deportistas y sedentarios sanos mediante el estudio 2d strain speckle tracking
Rivero CD	Palma de Mallorca, Esp.	Comparación de parámetros mediante eco 2d entre deportistas y sedentarios sanos
Robledo-Nolasco R	México, D.F.	Efectos de la terapia de resincronización cardiaca a largo plazo en pacientes con miocardiopatía dilatada
Rodas CCR	México, D.F.	Tratamiento intervencionista de estenosis pulmonar severa, con importante repercusión hemodinámica
Rodas CCR	México, D.F.	Tratamiento intervencionista de estenosis pulmonar severa asociada a miocardiopatía no compacta del ventrículo derecho
Rodríguez-Díez G	México, D.F.	Comparación del electrodo-desfibrilador colocado en el ápex contra el tracto de salida del ventrículo derecho en dos centros cardiológicos de referencia
Romero MH	León, Gto	Correlación entre la PaCO ₂ arterial por gasometría y la ETCO ₂ por capnometría en cirugía cardiaca con bomba de circulación extracorpórea
Salas-Llamas JP	México, D.F.	Precisión diagnóstica de la angiografía por tomografía de 64 cortes comparándola con la coronariografía convencional e importancia del score de calcio
Sánchez LJM	León, Gto	Comparación de intervención coronaria percutánea multivaso <i>versus</i> enfermedad de un solo vaso
Sánchez LJM	León, Gto	Registro de intervención coronaria percutánea. IMSS, Bajío
Sánchez LJM	León, Gto.	Intervención coronaria percutánea en pacientes ancianos
Sánchez MI	México, D.F.	Angioplastia y stent carotídeo en pacientes sintomáticos y asintomáticos. resultados inmediatos y a 6 meses
Sánchez-Rodríguez MI	Monterrey, N.L.	Angioplastia y stent carotídeo en pacientes mayores y menores de 75 años: resultados a 6 meses
Sandoval MKV	México, D.F.	Endocarditis y conducto arterioso persistente. Reporte de un caso
Sandoval SEG	México, D.F.	Pentalogía de Cantrell y ectopia cordis: cuarenta años de experiencia en el Hospital Infantil de México «Federico Gómez»

Sandoval SEG	México, D.F.	Pentalogía de Cantrell y ectopia cordis: cuarenta años de experiencia en el Hospital Infantil de México «Federico Gómez»
Sereno VG	México, D.F.	Análisis de los efectos agudos y crónicos inducidos por la administración de (-) epicatequina (principio activo del cacao) en un modelo de daño miocárdico inducido por isquemia-reperfusión coronaria en ratas
Solache-Ortíz G	México, D.F.	Prevalencia y características del síndrome metabólico en una población urbana de la Ciudad de México. El estudio Lindavista
Solís M	León, Gto.	Ecocardiograma de estrés farmacológico con dobutamina para diagnóstico de cardiopatía isquémica en pacientes con síndrome metabólico
Solorio S	León, Gto.	Relación entre los niveles de proteína C reactiva y extensión del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST
Solorio S	León, Gto.	Asociación de la longitud del telómero y proteína C reactiva con el desarrollo de circulación colateral en pacientes con enfermedad arterial coronaria
Solorio S	León, Gto.	Efecto antiinflamatorio de las estatinas en el pronóstico del infarto agudo del miocardio
Soto GJI	México, D.F.	Niveles de péptido natriurético tipo b en niños con insuficiencia cardíaca
Taredo SJM	México, D.F.	Mixoma auricular derecho debutante con embolia paradójica sistémica a través de una comunicación interatrial coexistente
Téllez A	Houston, Texas	Expresión de citocinas proinflamatorias en un modelo porcino de inyección intramural de lípidos para la inducción de aterosclerosis coronaria
Téllez A	Houston, Texas	Proteína quimotáctica de monocitos-1 promueve la neovascularización y fibrosis vascular en un modelo porcino de aterosclerosis inducido por inyección intramural de lípidos
Téllez A	New York, USA	Evaluación prospectiva <i>in vivo</i> del ritmo de degradación de dispositivo de cierre en angioplastia coronaria (angioseal®)
Teniente VR	León, Gto.	Frecuencia y oportunidad de tratamiento de reperfusión en un grupo de pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST
Teniente-Valente R	León, Gto.	Frecuencia de factores de riesgo cardiovascular «tradicionales» en pacientes infartados
Teniente-Valente R	León, Gto.	Infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST: diferencias en factores de riesgo, manejo y complicaciones entre el adulto mayor y el adulto menor
Teniente-Valente R	León, Gto.	Infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST: diferencias en factores de riesgo, manejo y complicaciones entre mujeres y hombres
Torres HME	Villahermosa, Tabasco	Comportamiento de la presión pulmonar posterior a valvuloplastia mitral percutánea con balón Inoue
Treviño AE	Monterrey, N.L.	Stents liberadores de fármacos en vasos pequeños: experiencia en el Hospital San José Tec de Monterrey
Vargas CE	México, D.F.	Correlación de la perfusión miocárdica de alto riesgo con la angiografía coronaria en pacientes atendidos en el Servicio de Cardiología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre
Vargas CA	México, D.F.	Acceso vascular radial <i>versus</i> femoral en pacientes sometidos a cateterismo e intervencionismo coronario en el Laboratorio de Hemodinamia del Centro Médico Nacional «20 de Noviembre»
Vargas RJF	Monterrey, N.L.	Ablación septal en miocardiopatía hipertrófica: experiencia de 6 años en un Hospital de Cardiología
Vargas RJF	Monterrey, N.L.	Incidencia, evolución y factores de riesgo para mortalidad en choque cardiogénico por infarto agudo al miocardio: experiencia de un Hospital de Cardiología
Vásquez JC	México, D.F.	Complicaciones cardiovasculares en la arteritis de Takayasu. Dieciséis años de experiencia quirúrgica en el Instituto Nacional de Cardiología «Ignacio Chávez»
Vázquez CG	México, D.F.	Adecuación de los niveles de glucosa y lípidos en pacientes cardiopatas, después de ser sometidos a un programa de rehabilitación cardíaca de fase II
Vázquez CG	México, D.F.	Desplazamiento del umbral de isquemia con administración subcutánea de enoxaparina sódica, en el programa de rehabilitación cardíaca
Vázquez CG	México, D.F.	La pendiente ventilatoria como variable pronóstica de hospitalización, en pacientes con insuficiencia cardíaca
Velasco SG	Guadalajara, Jal.	Angioplastia primaria en infarto con stents medicados
Yáñez RTG	Villahermosa, Tabasco	Positividad de ecocardiograma stress con dobutamina y su correlación con la angiografía
Yáñez-Gutiérrez L	México, D.F.	Valvuloplastia aórtica con técnica de estimulación
Zúñiga SJ	Guadalajara, Jal.	Enfermedad de tronco principal no protegido tratada con stents medicados
Zúñiga SJ	Guadalajara, Jal.	Tromboembolia pulmonar masiva. Tratamiento con heparina, trombólisis y filtro