

Quiz

Quiz

Itzel Anayn Flores Reyes,¹ Marco Antonio Rodríguez Castellanos,² Ezequiel Vélez Gómez³ y Juan Gabriel Barrientos García⁴

¹ Residente de Dermatología

² Dermatólogo

³ Anatomopatólogo

⁴ Dermatólogo y dermatopatólogo

Instituto Dermatológico de Jalisco Dr. José Barba Rubio

Caso clínico

Paciente de 57 años de edad, originaria y residente de Guadalajara, Jalisco, sin antecedentes personales patológicos. Acudió a consulta porque presentaba una dermatosis de dos años de evolución, asintomática, localizada en el área dorsal del tronco, en línea paravertebral derecha, unilateral y asimétrica. Constituida por una placa ovalada de 3 × 2.1 cm, de color eritematosa, con áreas blanquecinas, superficie lisa, borde bien delimitado eritematoso, sobrelevado, aparentemente de evolución crónica (figura 1).

Los hallazgos histopatológicos mostraron epidermis con hiperqueratosis y agranulosis, con separación dermoepidérmica, se observó contenido proteináceo a nivel de la dermis papilar (azul alcian). El resto del tejido conectivo dérmico mostró infiltrado inflamatorio linfohistiocitario perivascular (figuras 2 y 3).

(Respuesta en página 107)




Figura 2. H-E: desprendimiento de la epidermis a nivel subepidérmico por contenido proteináceo en la dermis papilar (10x).



Figura 1. Clínica, mucinosis cutánea en placa.




Figura 3. Azul alcian: contenido mucinoso a nivel de la dermis papilar (40x).

CORRESPONDENCIA

Dr. Marco Antonio Rodríguez Castellanos ■ Teléfono: 33 3030 4536
Calzada del Federalismo Norte 3102, Atemajac del Valle, C.P. 45190, Guadalajara, Jalisco