



Evaluación de las conductas sexuales de riesgo y hábitos anticonceptivos en una muestra de población mexicana

Evaluation of sexual risk behaviors and contraceptive habits in a sample of the Mexican population.

Roberto González-Habib,¹ Adriana Edith Pastén-Zapata,² Sergio Zetina-Alvarado²

Resumen

OBJETIVO: Evaluar, a través de una encuesta, la situación actual de las conductas sexuales de riesgo en una muestra de población mexicana de entre 15-60 años, e identificar los métodos de planificación familiar más utilizados y el promedio de inicio de la vida sexual.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, transversal, con muestreo no probabilístico tipo "bola de nieve". Se aplicó una encuesta validada internacionalmente de conductas sexuales de riesgo, entre julio y octubre de 2017, en una muestra mexicana de 15-60 años de edad. Se excluyeron las encuestas incompletas y con discordancias, y personas de otras nacionalidades. Entre las variables estudiadas se incluyeron: sexo, edad y estado socioeconómico. Se calculó un tamaño de muestra de 385, con un intervalo de confianza de 95% (IC95%). Los datos se reunieron en el programa de Excel 2016, donde se analizaron e interpretaron.

RESULTADOS: Se encuestaron 689 sujetos, pero se excluyeron 38; de esta forma se registraron 650 casos. El 87.4% de los casos inició su vida sexual entre los 16 y 25 años; un tercio la calificó satisfactoria. El 50% de los encuestados de entre 13 y 15 años utilizó preservativo. El 61% refirió la comunicación de temas sexuales con sus padres poco satisfactoria o inexistente; 6.6% no utiliza o es usuario de algún método de planificación y 40.3% recurre a uno poco efectivo.

CONCLUSIÓN: Es importante conocer las prácticas sexuales de la población mexicana, para identificar las áreas de oportunidad, promover la prevención de prácticas sexuales de riesgo y aumentar la difusión de la información.

PALABRAS CLAVE: Prácticas sexuales de alto riesgo; métodos anticonceptivos; vida sexual; encuesta.

Abstract

OBJECTIVE: Evaluate, through an internationally validated survey, the risky sexual behavior in a Mexican sample between 15-60 years, the average of initiation of sexual activity and the most used contraceptive methods.

MATERIALS AND METHODS: Descriptive, cross-sectional study, with non-probabilistic sampling type snowball. We apply an internationally validated survey of Risky Sexual Behavior between July and October 2017 through social networks to Mexican population between 15 and 60 years. Incomplete surveys were excluded, with disagreements in responses and people of other nationalities. The variables studied included sex, age and socioeconomic status. A sample size of 385 was calculated with a confidence level of 95%. The data was gathered in an Excel sheet 2016 where they were analyzed and interpreted.

RESULTS: A total of 689 subjects were surveyed, 38 were excluded; In this way, a total of 650 cases were registered. 87.4% started sexual life between 16 and 25 years old, being satisfactory in a third of the cases. 50% of people between 13 and 15 years used condoms and 56% between 16 and 18 years. 61% reported the communication of sexual issues with their parents unsatisfactory or non-existent. 6.6% of people do not have a planning method while 40.3% have a little cash.

¹ Jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia, y del Departamento de Educación e Investigación en Salud.

² Residente de cuarto año de Ginecología y Obstetricia.
Christus Muguerza-Hospital Conchita, Monterrey, Nuevo León.

Recibido: septiembre 2018

Aceptado: noviembre 2018

Correspondencia

Adriana Edith Pastén Zapata
dra.adrianapasten@gmail.com

Este artículo debe citarse como

González-Habib R, Pastén-Zapata AE, Zetina-Alvarado S. Evaluación de las conductas sexuales de riesgo y hábitos anticonceptivos en una muestra de población mexicana. Ginecol Obstet Mex. 2019 marzo;87(3):153-166.
<https://doi.org/10.24245/gom.v87i3.2542>

CONCLUSION: It is important to know the sexual practices in the Mexican population to detect areas of opportunity, make changes in the prevention of risky sexual actions and in the distribution of information.

KEYWORDS: Risky sexual behavior; Contraceptive methods; Sexual activity; Survey.

ANTECEDENTES

La Comisión de Determinantes de la Salud (CDS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su informe del año 2008, describieron tres criterios para mejorar la calidad de la salud: 1) mejorar las condiciones de vida, 2) pugnar contra la distribución no equitativa del dinero y los recursos, y 3) medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones.¹ Se sabe que mientras se genere desarrollo social, la salud de la población mejorará de forma proporcional.²

De acuerdo con el INEGI, la tasa de analfabetismo disminuyó de 9.5 a 5% en el lapso 2000-2015. Un mayor porcentaje de la población ha completado el nivel de educación básica, aumentando de 91.3 a 96.2% en el año 2000 y 2015, respectivamente.³

Con el comienzo de la vida sexual se inicia, también, el riesgo de embarazos e infecciones sexualmente transmisibles. Conforme transcurre el tiempo, se observa que el inicio de vida sexual es cada vez más temprano en México; el estudio de Gayet⁴ comparó los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) de 2009 y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSN) de 2012 y observó un aumento exponencial de las personas que iniciaban su vida sexual antes de los 20 años.⁴ Según la ENSN de 2012, el 31.2% de los sujetos de entre 15 y 19 años había iniciado su vida

sexual; al dividirlos por edad se obtuvieron las siguientes cifras: 19.2% a los 16 años, 26.3% a los 17 años, 45.7% a los 18 y 54.8% a los 19 años. En este mismo grupo de edad, 47.8% reportó el uso de condón masculino en la última relación sexual, incluso 80% refirió el conocimiento de su uso.⁵ La encuesta también describe que 98.6% de las personas de entre 15 y 29 años conoce o ha escuchado hablar de al menos un método anticonceptivo y 94.4% conoce su uso.⁶

Algunos datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) de 2014, realizada por el INEGI, indican que 44.9% de las adolescentes de entre 15 y 19 años sexualmente activas no utilizaron métodos anticonceptivos en su primera relación sexual. Para el año 2013, el 83.9% de los ingresos y egresos hospitalarios se relacionaron con causas obstétricas en ese mismo grupo de edad, lo que sugiere que por cada mil mujeres, 77 tienen un evento obstétrico; sin embargo, debe considerarse que, de las mujeres menores de 19 años, 30.6% no recibieron atención prenatal.⁷

Las prácticas de actos sexuales de riesgo predisponen a la infección por enfermedades de transmisión sexual. Según la OMS, más de 1 millón de personas al día se infectan en todo el mundo; no obstante, la mayoría suele no expresar síntomas o los manifiesta en grado leve, por lo que no acuden a consulta.⁸ En México, las infecciones de transmisión sexual se encuentran



entre las 10 primeras causas de morbilidad, lo que representa un problema de salud pública, con promedio estimado de 220,000 casos anuales aún conociendo que esto es un subregistro.⁹ Existe un aumento en la difusión de información acerca de métodos de planificación familiar y de infecciones de transmisión sexual; sin embargo, la prevalencia de este tipo de enfermedades sigue siendo alta.

Existe una encuesta piloto de hábitos sexuales de riesgo, validada internacionalmente y diseñada en Granada, que fue utilizada en un estudio para valorar las respuestas de los participantes ante los diversos formatos de preguntas y su efecto en la calidad de la información;¹⁰ posteriormente, esta encuesta la utilizó el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, para la obtención de información referente a conductas sexuales, y después por autores españoles en protocolos de la misma índole.¹¹

El objetivo de este estudio fue: evaluar el estado actual de las conductas sexuales de riesgo en una muestra de población mexicana de entre 15-60 años, e identificar los métodos de planificación familiar más utilizados y el promedio del inicio de la vida sexual.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio descriptivo, transversal, con muestreo no probabilístico tipo “bola de nieve”, efectuado a través de la Encuesta de Conductas de Alto Riesgo,¹¹ validada internacionalmente (previa aplicación en la población española), ahora modificada con modismos de la lengua española en México y a la que se agregaron preguntas para determinar el nivel socioeconómico y estado de origen de los encuestados, con la finalidad de determinar la heterogeneidad de la población muestra. La encuesta consta de seis apartados: 1) características sociodemográficas, 2) estilos de vida, 3) información y experiencia sexual, 4)

salud sexual, 5) prueba de VIH y 6) conocimiento y opiniones acerca del SIDA. **Anexo**


El tamaño de la muestra se calculó en un formato disponible en internet (URL: <https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/>), a partir de la población calculada, con límites de edad de 15 a 60 años, se obtuvieron 75,500,000, proporcionado por el INEGI en el 2015,¹² con IC95% y margen de error de 5%, señalando un tamaño total de la muestra de 385.

Para su distribución se envió el enlace, de manera aleatoria, a través de correo electrónico y redes sociales a las personas que se encontraban en la lista de contactos de los investigadores principales y estas se encargaron de su reenvío a terceras personas. Posterior a la aplicación de la encuesta, la información fue enviada a una base de datos de Excel 2016, donde se contabilizaron las respuestas. En el mismo programa se realizaron las gráficas para cada una de las preguntas y entender mejor los resultados, mediante el análisis estadístico descriptivo. La prueba de correlación de Pearson permitió buscar la relación entre el grado de estudios y la edad de inicio de vida sexual, y entre el salario mensual con el número de compañeros sexuales.

RESULTADOS

Se encuestaron 689 sujetos, de los que se excluyeron 11 por tener nacionalidad diferente a la mexicana y 28 por enviar encuestas incompletas; de esta forma se registraron 650: 569 (87.5%) mujeres y 81 (12.5%) hombres. **Figura 1**

La mayoría tenía 31-40 años (40%, n = 260), 26-30 años (22.9%, n = 149), 19-25 años (15.3%, n = 100), 41-50 años (11%, n = 72). 51-60 años (10.3%, n = 67) y 16-18 años (0.3%, n = 2). El 15% (n = 98) radicaba en Nuevo León, 10% (n = 70) en Guanajuato, 9% (n=59) en la Ciudad de México, 26% no especificó su estado de origen



y el resto se encontraba en diferentes estados de la República Mexicana.

El ingreso mensual fue de \$35,000-85,000 en 40% (n = 260), de \$11,600-35,000 en 27.5% (n = 179), de \$85,000 o mayor en 14.2% (n = 92), no se definió en 8.8% (n = 57), de \$6800-11,600 en 7.1% (n = 46), de \$2700-\$6800 en 1.8% (n = 12) y menos de \$2700 en 0.6% (n = 4).

Casi todos los encuestados habían terminado la licenciatura (92.1%, n = 599) o alguna carrera técnica (3.69%, n = 24) y muy pocos el nivel básico (0.30%, n = 2) o medio (3.84%, n = 25). El 73% (n = 475) se encontraba trabajando, 12% (n = 82) estudiando, 8.9% (n = 58) se dedicaba al hogar, 2.1% (n = 14) no especificó su ocupación, 1.69% (n = 11) estaba desempleado, 0.76% (n = 5) pensionado, 0.3% (n = 2) desempleado o nunca había trabajado, 0.15% (n = 1) incapacitado y 0.3% (n = 2) voluntariado.

El 61% (n = 400) refirió que la comunicación acerca de temas sexuales con los padres había sido poco satisfactoria, nada satisfactoria o, incluso, no hubo comunicación con estos. Las principales fuentes de información de temas sexuales fueron los amigos (20.76%, n = 135), profesores (19.23%, n = 125), madre (18.15%, n = 118) y libros, revistas o periódicos (16.15%, n = 105). **Figura 2** Las principales fuentes de información en cuanto

a anticoncepción fueron: personal de salud (31%, n = 202), profesores (24%, n = 156) y amigos (14%, n = 93). **Figura 3**

El 94% (n = 611) de los encuestados tenía vida sexual activa, y de estos, 50% (n = 306) inició entre los 19-25 años y 37.4% (n = 229) entre los 16-18 años. Se registraron tres casos de violaciones: 2 antes de los 7 años y 1 entre los 7-12 años. **(Figura 4)** El 77.5% (n = 474) tuvo la primera relación sexual con su pareja, 10.3% (n = 63) con algún conocido, 8.5% (n = 52) con su esposo, 2.29% (n = 14) con un desconocido, 0.5% (n = 3) con un pariente (todos fueron violaciones) y 0.8% (n = 5) no especificó con quién.

Cuando se pidió que eligieran la frase que reflejara mejor su relación con quien tuvieron por primera vez relaciones sexuales, la mayoría describió una relación de pareja 68.08% (n = 416), 9% (n = 55) con algún compañero de escuela u oficina y 8.67% (n = 53) con su esposo (recién casados). En cuanto al sitio de su primera relación, 34.3% (n = 210) refirió haber sido en casa de su pareja, 24.5% (n = 150) en un hotel y 17.8% (n=109) en su propio hogar. El 34.20% (n = 209) consideró no satisfactoria su primera relación sexual, 33.22% (n = 203) satisfactoria y 32.4% (n = 198) satisfactoria, pero “no como lo esperaba”.

Del total de quienes tuvieron relaciones sexuales, 54% (n = 330) respondió haber utilizado preservativo en su primera relación, 45.5% (n = 278) no lo habían utilizado y 0.5% (n = 3) no especificó ningún preservativo. El 95.6% (n = 584) mencionó haber utilizado preservativo en algún momento de su vida, 3.6% (n = 22) nunca lo utilizó y 0.8% (n = 5) no especificó su uso. De quienes no habían utilizado preservativo en su primera relación sexual, 21.5% (n = 60) refirió no haberlo hablado con su pareja, 14.3% (n = 40) estaba utilizando otro método anticonceptivo, 14.02% (n = 39) porque conocía lo suficiente




Figura 2. Principal fuente de información de temas sexuales.





Figura 3. Principal fuente de información en anticoncepción.

a su pareja y 12.5% (n = 35) porque no tenía preservativos en ese momento.

El 68.7% (n = 420) señaló tener precaución para evitar el embarazo, 33.35% (n = 136) refirió no haber tomado ninguna precaución, 8.8% (n = 54) no tener precaución porque no hubo penetración vaginal y 0.16% (n = 1) no especificó si había tomado precauciones. El 73% (n = 446)

comentó no haber tenido un embarazo no planeado, 26.2% (n = 160) tuvo un embarazo no planeado y 0.8% (n = 5) no lo especificó.

Del total de quienes comentaron haber iniciado la actividad sexual, 94% (n = 573) refirió sexo oral: 87.1% (n = 499) mujeres y 12.9% (n = 74) hombres. El 93.1% (n = 569) señaló haber realizado sexo oral: 87% (n = 500) mujeres y 13% (n



= 69) hombres. De igual manera, se interrogó por la práctica de sexo anal y se encontró que 30.4% (n = 186) había tenido esta práctica: 80.1% (n = 149) mujeres y 19.9% (n = 37) hombres.

Quienes habían tenido relaciones sexuales, 96.4% (n = 589) refirió no haber pagado por esta práctica *versus* 2.8% (n = 17); el resto, es decir, 0.8% (n = 5) no especificó si había pagado por tener relaciones sexuales. De los encuestados que indicaron haber pagado por tener relaciones sexuales, 94.1% (n = 16) utilizó preservativo *versus* 5.9% (n = 1) que no utilizó.

El 27.5% (n = 168) tenía entre 5-9 parejas sexuales, 22.9% (n = 140) refirió 1 pareja, 12.9% (n = 79) 3 y 10.9% (n = 67) 2 parejas. **Figura 5**

El coeficiente de correlación de Pearson no demostró asociación significativa entre el grado de estudios y la edad de inicio de vida sexual,

al igual que el salario mensual y cantidad de compañeros sexuales.

Respecto de quienes iniciaron vida sexual, se interrogó por los métodos anticonceptivos utilizados con su pareja, incluso de seleccionar uno o más métodos y se encontró que el preservativo fue utilizado por 29.6% (n = 270), la píldora del día siguiente por 20.7% (n = 189), coito interrumpido 12.5% (n = 114) y ritmo en 7.12% (n = 65). **Figura 6**

Al interrogar acerca del diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual, 71.5% (n = 463) señaló no tener ninguna, 11.1% (n = 72) micosis vaginal, 5.56% (n = 36) infección por VPH y 3.8% (n = 25) infección por clamidia. **(Figura 7)** A quienes contestaron haber sido diagnosticados con alguna enfermedad de transmisión sexual se les interrogó acerca del tiempo transcurrido y 67% (n = 100) no lo especificó, 11.4% (n = 17) refirió su diagnóstico hace más de 5 años, 10.8% (n = 16) entre 1-5 años y 10.8% (n = 16) menos de 1 año.

El 33.1% (n = 202) señaló haber tenido, en algún momento, más de una pareja de manera sincrónica: 77.7% (n = 157) correspondió a mujeres. El 3.4% (n = 21) refirió haber tenido sexo en grupo: 61.9% (n = 13) fueron mujeres y 38% (n = 8) hombres.

DISCUSIÓN

En la actualidad se ha conseguido que la población, en general, tenga más años de escolaridad y mayor cobertura de servicios de salud; sin embargo, se ha reportado un aumento relacionado con prácticas sexuales de riesgo. Según los registros del INEGI de 2015,³ 31.2% de los mexicanos había iniciado su vida sexual a los 19 años, mientras que los datos encontrados en este estudio sugieren que este porcentaje se elevó a 55%, lo que refleja un aumento en la frecuencia del inicio de la vida




Figura 5. Cantidad de parejas sexuales (encuestados con vida sexual activa: n = 611).




Figura 6. Uso de métodos anticonceptivos (considerando la selección de uno o más métodos anticonceptivos sincrónicos).

sexual con el paso del tiempo. Este hallazgo es importante, pues significa que la mitad de la población inicia con prácticas sexuales y sus implicaciones (enfermedades y embarazos) antes de terminar el nivel medio superior. Comparado con el estudio de Gayet y sus coautores (2014),⁴ quienes reportaron un promedio de inicio de vida sexual a los 19.4 años, nuestro estudio indicó un promedio a los 19.7 años.

De acuerdo con la investigación de Domínguez,⁹ efectuada en la población mexicana, la inciden-

cia de enfermedades de transmisión sexual es de 20%, lo que coincide con 23% de nuestro estudio, que aunque no representa un porcentaje tan elevado, la mayor parte de las enfermedades sexuales suelen ser subdiagnosticadas, debido a que la mayoría de los pacientes no acude a consulta.

El 61% de los encuestados refirió que la comunicación con sus padres acerca de temas sexuales fue poco satisfactoria, incluso inexistente, y que la fuente principal procedía de amigos de la




Figura 7. ¿Se le ha diagnosticado alguna enfermedad de transmisión sexual? Una persona pudo seleccionar una o más enfermedades a lo largo de su vida. ETS: enfermedad de transmisión sexual.

misma edad, quizá tan inexpertos como ellos. No obstante, la principal fuente de información de anticoncepción la ofrece el personal de salud y los profesores, por lo que deben estar bien capacitados, para brindar información veraz y sencilla.

Se observó que 87.4% refirió haber iniciado vida sexual entre los 16 y 25 años, es decir, mientras cursaba el nivel medio superior y superior, y un tercio de los casos la indicó satisfactoria. Con base en esto, la educación sexual debe iniciar en el nivel medio (secundaria), incluso antes. Contrario a lo que se piensa, el sitio donde ocurren las primeras relaciones sexuales es en la propia casa o en la de la pareja (52.2% de los casos).

La ENADID de 2014³ sugiere que 49.9% de las personas de 15-29 años de edad que inicia vida sexual utiliza el preservativo masculino en el primer encuentro, lo que coincide con nuestros resultados, principalmente en 50% de los casos de 13-15 años y 56% de 16-18 años. De las personas que no utilizaron preservativo entre 13 y 18 años, es decir, que se encuentran en secundaria y preparatoria, 22% refirió porque no habían hablado del tema, 14% por no haber tenido preservativos en ese momento y 6% pensaba no tener riesgo; por tanto, deben tomarse precauciones para que los preservativos se encuentren disponibles en todo momento, además de mejorar la comunicación con los sujetos de este grupo de edad, con la intención de conocer los riesgos y las acciones para disminuirlos, así como alentar la comunicación efectiva entre padres-hijos y pareja-pareja.

Hoy día, la práctica del sexo oral y anal ya no se considera tabú. En cuanto al número de parejas sexuales, 27.5% refirió haber tenido entre 5 y 9 parejas y 15.8% más de 10 parejas sexuales, lo que representa 43.3% del total de las personas con más de cinco parejas sexuales.

El 6.68% de las personas no cuenta con un método de planificación familiar; sin embargo, 20.7% utiliza la píldora del día siguiente, considerada un anticonceptivo de emergencia y que cuenta con un índice de Pearl muy elevado (12-14% según la CDC). El coito interrumpido y el ritmo representan los métodos menos efectivos. En total, esto representaría que 46.9% de los casos sin método seguro y poco eficaz.

No se encontró relación significativa entre el grado de estudios y el salario mensual con el inicio de vida sexual activa y la cantidad de parejas sexuales; por tanto, no significa necesariamente que al aumentar el grado de estudios disminuyan las prácticas sexuales de alto riesgo.



Entre los sesgos del estudio resalta: la mayoría de las personas encuestadas refirió un ingreso mensual superior a \$11,600 por lo que en estudios posteriores sugerimos aumentar la cantidad de personas encuestadas, incluso con niveles socioeconómicos más bajos. Casi todos los encuestados fueron mujeres (87.5%) y se registraron pocos sujetos entre 16 y 18 años de edad.

CONCLUSIÓN

Es importante conocer las prácticas sexuales de la población mexicana para identificar áreas de oportunidad, prevenir prácticas de riesgo y aumentar la difusión de la información. El promedio de inicio de vida sexual es a los 19.7 años y 27.5% tiene entre 5 y 9 parejas sexuales en su vida. El 6.6% de las personas no cuenta con un método de planificación y 40.3% tiene uno poco efectivo. No existe relación entre el grado de estudios y el salario mensual con el inicio de vida sexual activa y la cantidad de parejas sexuales.

REFERENCIAS

1. Organización Mundial de la Salud. Reducir las inequidades sanitarias actuando sobre los determinantes sociales de la salud. (2009). Ginebra: 62a. Asamblea Mundial de la Salud [en línea]. Dirección URL: <http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA62-REC1/A62_REC1-sp.pdf>
2. Wong C. Determinantes sociales de la salud. (2012). México: Determinantes sociales de la salud. [en línea]. Dirección URL: <<https://saludpublicayepi.files.wordpress.com/2012/06/determinantes-sociales-2012.pdf>>
3. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Principales resultados de la encuesta intercensal 2015 de los Estados Unidos Mexicanos. (2015). México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. [en línea]. Dirección URL: <http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825078966.pdf>.
4. Gayet C, et al. Calendario de inicio sexual en México. Comparación entre encuestas nacionales y tendencias en el tiempo. *Salud Publica Mex* 2014;56(6). <http://dx.doi.org/10.21149/spm.v56i6.7391>
5. Allen B, et al. Inicio de vida sexual, uso de anticonceptivos y planificación familiar en mujeres adolescentes y adultas en México. *Salud Publica Mex* 2013;55(2). <http://dx.doi.org/10.21149/spm.v55s2.5120>
6. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estadística a propósito del día internacional de la juventud. (2016). México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. [en línea]. Dirección URL: <http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/juventud2016_0.pdf>
7. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estadística a propósito del día internacional de la juventud. (2015). México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. [en línea]. Dirección URL: <<http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/juventud0.pdf>>
8. Organización Mundial de la Salud. Infecciones de transmisión sexual. (2016). Organización Mundial de la Salud. [en línea]. Dirección URL: <[http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-\(stis\)](http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis))>
9. Dominguez L. Enfermedades de Transmisión sexual. (2008). México: Departamento de Dermatología del Hospital General "Dr. Manuel Gea González". [en línea]. Dirección URL: <<https://es.scribd.com/document/253955470/Enfermedades-de-Transmision-Sexual-Facultad-de-Medicina-UNAM>>
10. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de salud y hábitos sexuales. (2004). España: Instituto Nacional de Estadística <<https://www.ine.es/daco/daco42/sida/metosida.pdf>>
11. Rontomé C, Cantón J. Encuestas sobre conductas sexuales de riesgo entre la población de Ceuta. (2010). España: Consejería de Sanidad y Consumo de la Ciudad Autónoma de Ceuta. <<http://www.ceuta.es/ceuta/images/servicios/sanidad/documentos/sida/EncuestaHabitos-Sexuales.pdf>>
12. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Principales resultados de la encuesta intercensal. (2015). México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. [en línea]. Dirección URL: <http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825078966.pdf>
13. Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud. (2012). México: Instituto Nacional de Salud Pública. [en línea]. Dirección URL: <<https://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf>>

Anexo. Encuesta de conductas sexuales de alto riesgo.

1. Sexo

- Hombre
- Mujer

2. ¿En qué año naciste?

3. ¿En dónde naciste?

- México
- USA
- Sudamérica
- Canadá
- Europa
- Otro

4. ¿Cuál es tu grado máximo de estudios?

- Analfabeta
- Primaria
- Secundaria
- Preparatoria
- Carrera técnica
- Universidad

5. Actividad económica en los últimos meses

- Trabajo
- Desempleado, pero he trabajado
- Desempleado, buscando primer trabajo
- Pensionista
- Incapacidad para trabajar
- Estudiante
- Hogar
- Voluntariado
- Otra

6. Estado civil

- Soltero(a)
- Casado(a)
- Divorciado(a)
- Viudo(a)
- Separado(a)

7. Profesión

8. ¿Con quién has vivido la mayor parte del tiempo los últimos años?

- Solo
- Cónyuge-pareja
- Cónyuge-pareja e hijos
- Padres
- Hijos propios
- Amigos-compañeros
- Otros familiares
- Otras personas

9. ¿Con qué frecuencia sales por las noches (divertirse, cenar) los últimos 12 meses?

- Ningún día
- Menos de 1 día por mes
- 1 a 3 días al mes
- 1 a 2 días a la semana
- 3 o más días a la semana

10. ¿Has consumido bebidas alcohólicas de cualquier tipo en los últimos 12 meses?

- Sí
- No

11. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas alcohólicas (cualquiera) los últimos 12 meses?

- No consumo
- Diariamente
- 4 a 6 veces por semana
- 2 a 3 veces por semana
- 1 vez por semana
- 1 vez cada dos semanas
- 1 vez al mes
- Menos de 1 vez al mes

12. Los últimos 30 días, ¿cuántos días consideras que has estado bebido, aunque sólo fuera un poco?

- Ninguno
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



- 6-10
- 11-15
- 16-20
- 20-30

13. ¿Alguna vez en tu vida has tomado o te has inyectado alguna droga (sin contar alcohol)?

- Sí
- No

14. ¿En qué medida fue satisfactoria la comunicación con tus padres acerca de temas sexuales?

- Muy satisfactoria
- Bastante satisfactoria
- Satisfactoria
- Poco satisfactoria
- Nada satisfactoria
- No tuve comunicación alguna.

15. ¿Cuál fue tu principal fuente de información de temas sexuales?

- Padre
- Madre
- Hermano
- Cónyuge-pareja
- Otro familiar
- Profesor
- Amigos de mi edad
- Médico-enfermera-personal de salud
- Televisión-radio
- Internet
- Libros-revistas-periódicos
- A mí nadie me contó nada

16. ¿Cuál fue tu principal fuente de información de anticonceptivos?

- Padre
- Madre
- Hermano
- Cónyuge-pareja
- Otro familiar
- Profesor
- Amigos de mi edad

- Médico-enfermera-personal de salud
- Televisión-radio
- Internet
- Libros-revistas-periódicos
- A mí nadie me contó nada

17. ¿Alguna vez te has masturbado (auto complacerte sexualmente)?

- Sí
- No

18. ¿A Los cuántos años de edad empezaste con la masturbación? Si nunca lo hiciste no contestes

19. ¿A qué edad empezaste a salir con fines afectivos?

20. ¿A qué edad fue tu primer beso?

21. ¿Has tenido relaciones sexuales alguna vez en tu vida? (oral, vaginal o anal)

- Sí
- No

22. ¿En qué lugar tuviste tu primera relación sexual? (si no has tenido no contestes)

23. ¿Qué edad tenías cuando tuviste tu primera relación sexual? (si no has tenido no contestes)

24. ¿Qué parentesco tenías con esta persona? (si no has tenido no contestes)

25. ¿Tu primera relación sexual fue satisfactoria? (si no has tenido no contestes)

- Sí
- Sí, pero no fue como lo esperaba
- No

26. ¿Usaste preservativo en tu primera relación sexual? (si no has tenido no contestes)

- Sí
- No

27. Cuando tuviste tu primera relación sexual, ¿qué edad tenía tu pareja? (si no has tenido no contestes)

- 26 a 30
- 30 a 40
- 40 a 50
- Más de 50

28. ¿Te han realizado sexo oral?

29. ¿Has realizado sexo oral?

30. ¿Has practicado el sexo anal?

35. ¿Has utilizado preservativo alguna vez durante tus relaciones sexuales? (si no has tenido no contestes)

- Sí
- No

31. Tu primera relación sexual fue vía... (si no has tenido no contestes)

- Oral
- Vaginal
- Anal
- Mixta

36. ¿Has tenido algún embarazo no planeado?

- Sí
- No

32. A lo largo de tu vida has tenido relaciones sexuales con... (si no has tenido no contestes)

- Sólo con hombres
- Por lo general con hombres, pero al menos una vez con una mujer
- Sólo con mujeres
- Por lo general con mujeres, pero al menos una vez con un hombre
- Igual, hombres y mujeres

37. ¿Alguna vez en tu vida has tenido relaciones sexuales en las que pagaste por ello?

- Sí
- No

33. Tu orientación sexual es...

- Heterosexual
- Homosexual
- Bisexual

38. ¿Usaste preservativo la última vez que tuviste relaciones sexuales y pagaste por ello? (si no los has hecho no contestes)

- Sí
- No

34. En tu vida, aproximadamente ¿con cuántos hombres o mujeres has tenido relaciones sexuales por lo menos una vez? (si no has tenido no contestes)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5 a 9
- 10 a 15
- 16 a 20
- 21 a 25

39. ¿Qué frase de las siguientes refleja mejor tu relación la primera vez que tuviste relaciones sexuales? (si no has tenido no contestes)

- Estábamos recién casados
- Nos íbamos a casar
- Teníamos una relación de pareja
- Persona que ejercía la prostitución
- Nos acabábamos de conocer
- Compañero de escuela u oficina
- Pariente
- Otra relación

40. ¿Cuál es la razón principal por la que no utilizaste preservativo la primera vez que tuviste relaciones sexuales? (si no has tenido no contestes)

- No hablamos del tema antes de tener relaciones



- Era difícil proponerlo por miedo a perder a mi pareja
 - No teníamos preservativos en ese entonces
 - Conocía lo suficiente a mi pareja
 - El o ella no quería usarlo
 - Yo no quería usarlo
 - Utilizamos otro método anticonceptivo
 - Fue violación
 - Sólo tuvimos sexo oral
 - El tenía impotencia con el uso de preservativo
 - Estaba muy enamorado
 - Sin preservativo se siente mejor
 - Había bebido o usado drogas
 - Tenía un deseo descontrolado
 - Estábamos intentando tener hijos
 - Creí que no corría riesgos
 - Otra razón
41. ¿Tomaste precauciones para evitar el embarazo en esta primera relación sexual?
- Sí
 - No
 - No, porque no hubo penetración vaginal
42. ¿Cuál de los siguientes métodos para evitar el embarazo utilizan tú y tu pareja?
- Preservativo o condón
 - Píldora
 - Termina afuera (coito interrumpido)
 - Píldora del día siguiente
 - Ritmo
 - DIU
 - Anillo vaginal
 - Parche anticonceptivo
 - Vasectomía
 - Salpingoclasia
 - Lo hacemos durante la regla
 - Implante
 - Inyectable
43. ¿Te han diagnosticado a lo largo de tu vida alguna de las siguientes enfermedades? Selecciona las opciones correspondientes
- Infección por clamidia
 - Gonorrea
 - Sífilis
 - Tricomoniasis
 - Herpes genital
 - Condilomas
 - Infección por virus del papiloma en el cuello de la matriz
 - Micosis u hongos vaginales
 - Hepatitis B
 - Uretritis
 - Ladillas o piojos en el pubis
 - Otra enfermedad de transmisión sexual
 - Ninguna enfermedad
44. ¿Cuánto tiempo hace que tuviste esta enfermedad?
- Últimos 12 meses
 - Hace más de un año pero menos de 5 años
 - Hace más de 5 años
45. ¿Tienes más de 1 pareja sexual en la actualidad? (ya sea de forma permanente u ocasional)
- Sí
 - No
46. ¿Has tenido más de una pareja sexual en algún momento de tu vida? (ya sea de forma permanente u ocasional)
- Sí
 - No
47. ¿Has tenido sexo en grupo? (tríos, grupos, etc.)
- Sí
 - No

48. ¿Te has hecho alguna vez la prueba del SIDA?

- Sí, una vez
- Sí, varias veces
- Nunca

49. ¿Qué riesgo tiene una persona de infectarse de SIDA por mantener relaciones sexuales sólo con su pareja estable? (desde tu punto de vista)

- Alto riesgo
- Bajo riesgo
- Ninguno

50. ¿Qué riesgo tiene una persona de infectarse de SIDA por tener ocasionalmente relaciones sexuales con otra pareja además de su pareja estable? (desde tu punto de vista)

- Alto riesgo
- Bajo riesgo
- Ninguno

51. ¿Qué riesgo tiene una persona de infectarse de SIDA por tener relaciones sexuales con varias parejas? (desde tu punto de vista)

- Alto riesgo
- Bajo riesgo
- Ninguno

52. ¿En cuál de las siguientes circunstancias puede una persona adquirir SIDA?

(desde tu punto de vista, puedes seleccionar más de 1 opción)

- Relaciones sexuales
- Recibir sangre
- Lavabos públicos
- Bebiendo del vaso de una persona infectada
- Picadura de un mosquito
- Donar sangre
- En ninguna de estas
- Por un beso
- En un baño

53. ¿Cuál es el ingreso mensual aproximado de tu hogar?

- \$85,000 o más
- Entre \$35,000 y \$85,000
- Entre \$11,600 y \$35,000
- entre \$6,800 y \$11,600
- Entre \$2,700 y \$6,800
- Entre 0 y \$ 2,700

54. ¿En qué estado de la república mexicana te encuentras?

Fuente: Encuestas sobre conductas sexuales de riesgo entre la población de Ceuta (2010).¹¹

Puntaje para mantener la vigencia

El Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia otorga puntos para la vigencia de la certificación a los ginecoobstetras que envíen, a la página web del Consejo, un comentario crítico de un artículo publicado en la revista GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE MÉXICO. El comentario deberá tener mínimo 150 y máximo 500 palabras.