



# ¿Fertilización in vitro o conversión a inseminación intrauterina en baja reserva? Revisión sistemática y metanálisis

## Intrauterine insemination versus in vitro fertilization in poor responders: a systematic review and meta-analysis.

Jorge Rodríguez-Purata,<sup>1,2</sup> María José Gómez-Cuesta,<sup>1</sup> Enrique Cervantes-Bravo<sup>1,2</sup>

### Resumen

**OBJETIVO:** Determinar si en pacientes con baja respuesta ovárica la continuación del procedimiento de fertilización in vitro se asocia con aumento de la tasa de nacidos vivos *versus* la conversión a inseminación intrauterina.

**METODOLOGÍA:** Búsqueda sistemática de estudios con reporte de tasa de nacidos vivos en las principales bases de datos. La evaluación de la calidad de los estudios se hizo con la puntuación de la escala Newcastle-Ottawa (NOS). Se realizó un análisis de subgrupos por respuesta folícular.

**RESULTADOS:** Se recuperaron 28 citas pero solo se analizaron 7 que incluían datos de 3398 pacientes-ciclos. La puntuación promedio de calidad NOS fue de 9 *versus* la conversión del ciclo en una inseminación intrauterina. Las mujeres con baja respuesta ovárica a la estimulación, durante un ciclo de fertilización in vitro, que continuaron con la recuperación de ovocitos y la transferencia de embriones tuvieron mayor probabilidad de un nacido vivo: 9.2% *vs* 3.7%. En el análisis por respuesta folícular, la fertilización in vitro fue superior, excepto cuando se observó una respuesta monofolicular: 3.6% con fertilización in vitro *vs* 2.7%.

**CONCLUSIÓN:** En pacientes con baja respuesta ovárica ( $\leq 4$  folículos) durante un ciclo de fertilización in vitro, la persistencia con ésta se asoció con mayores probabilidades de lograr un nacido vivo *versus* la conversión a inseminación intrauterina, excepto en ciclos con una respuesta monofolicular, donde la conversión del ciclo en una inseminación intrauterina parece más juiciosa, en virtud de que las probabilidades de un nacido vivo son similares y no se necesitan procedimientos quirúrgicos ni de anestesia.

**PALABRAS CLAVE:** Infertilidad; fertilización in vitro; nacido vivo; tasa de nacimiento; transferencia de embriones.

### Abstract

**OBJECTIVE:** To determine whether in patients with low ovarian response the continuation of the in vitro fertilization procedure is associated with increased live birth rates *versus* conversion to intrauterine insemination.

**METHODOLOGY:** Systematic search of studies with reported live birth rates in major databases. Quality assessment of studies was done using the Newcastle-Ottawa Scale (NOS) score. Subgroup analysis by follicular response was performed.

**RESULTS:** Twenty-eight citations were retrieved from which 18 were chosen and only 7 including data from 3398 patient-cycles (in vitro fertilization: 2115; IUI: 1283) were analyzed. The mean NOS quality score was 9 *versus* cycle conversion to intrauterine insemination. Women with low ovarian response to stimulation, during an in vitro fertilization cycle, who continued with oocyte retrieval and embryo transfer were more likely to have a live birth: 9.2% *versus* 3.7% (OR 3.15 (95%CI: 2.26-4.41)).

<sup>1</sup> Clínica de la Fertilidad "Cdelaf", Ciudad de México.

<sup>2</sup> Centro Médico ABC, Ciudad de México.

**Recibido:** octubre 2020

**Aceptado:** enero 2021

### Correspondencia

Jorge Rodríguez Purata  
jorge@cdelaf.com

### Este artículo debe citarse como:

Rodríguez-Purata J, Gómez-Cuesta MJ, Cervantes-Bravo E. ¿Fertilización in vitro o conversión a inseminación intrauterina en baja reserva? Revisión sistemática y metanálisis. Ginecol Obstet Mex. 2021; 89 (3): 232-246.  
<https://doi.org/10.24245/gom.v89i3.4827>



In analysis by follicular response, in vitro fertilization was superior, except when a monofollicular response was observed: 3.6% with in vitro fertilization vs 2.7% (OR 1.02 (95%CI: 0.37-2.84)).

**CONCLUSION:** In patients with low ovarian response ( $\leq 4$  follicles) during an in vitro fertilization cycle, persistence with in vitro fertilization is associated with higher odds of achieving a live birth versus conversion to intrauterine insemination, except in cycles with a monofollicular response, where conversion of the cycle to intrauterine insemination seems more judicious, since the odds of a live birth are similar and no surgical procedures or anesthesia are needed.

**KEYWORDS:** Infertility; Fertilization in vitro; Live birth; Birth rate; Embryo transfer.

## ANTECEDENTES

La fertilización in vitro es una técnica que en la actualidad se ofrece a millones de personas en todo el mundo.<sup>1</sup> Consiste en una fase de estimulación ovárica controlada con gonadotropinas exógenas, lo que permite aumentar la cantidad de folículos y ovocitos maduros disponibles, lo que a su vez incrementa la cantidad de embriones de buena calidad disponibles para transferencia y mejora las tasas de embarazo clínico y de nacimiento vivo.<sup>2</sup>

Sin embargo, en alrededor de 6% de los ciclos de fertilización in vitro se obtienen menos de 5 folículos maduros a pesar de las altas dosis de gonadotropinas exógenas,<sup>3</sup> lo que se le denomina baja respuesta ovárica.<sup>4</sup> En general, las pacientes con baja respuesta ovárica tienen tasas de embarazo más bajas que quienes tienen una respuesta normal.<sup>3,5</sup> La fisiología detrás de los ovarios que reaccionan mal a la hiperestimulación es una cantidad reducida de folículos sensibles a la FSH, más frecuentemente relacionados con la reserva ovárica disminuida. Sin embargo, en algunos casos, una respuesta deficiente también se asocia con una exposición subóptima a las gonadotropinas; por ejemplo, en mujeres obesas<sup>6</sup> o con subtipos de receptores de FSH que

hacen que los folículos sean menos sensibles a las gonadotropinas exógenas.<sup>7</sup>

La mala respuesta a una estimulación ovárica controlada puede ser difícil de identificar antes de iniciar un ciclo de fertilización in vitro, incluso si se tiene en cuenta la edad de la paciente y la prueba de reserva ovárica.<sup>8</sup> Cuando se tratan pacientes con baja respuesta ovárica durante un ciclo de fertilización in vitro hay tres opciones disponibles. La primera es continuar con la estimulación a pesar de la baja respuesta, y llevar a cabo la recuperación de ovocitos y transferir los embriones disponibles.<sup>9</sup> Existe un riesgo alto de no recuperar ovocitos y de no tener embriones para transferir, lo que debe sopesarse frente a los riesgos de complicaciones asociadas con la captura ovocitaria y la anestesia. Además, tales situaciones podrían ser la fuente de una gran decepción y estrés para la pareja, y deberían ser aconsejados a fondo antes de continuar con la estimulación. La segunda opción es la conversión del ciclo de fertilización in vitro a una inseminación intrauterina en pacientes con al menos una salpinge permeable y parámetros de semen adecuados.<sup>10</sup> La conversión a inseminación intrauterina permite a la pareja beneficiarse de los tratamientos ya administrados, sin el

riesgo de una falla en la recuperación de los ovocitos-transferencia de embriones. Por último, la tercera opción es cancelar por completo el ciclo de fertilización *in vitro*.<sup>11</sup> La decisión de cancelar un ciclo siempre es desafiante porque implica no solo consideraciones clínicas, sino también emocionales y financieras.

En otros estudios se han analizado estas estrategias con desenlaces contradictorios, sobre todo debido a diseños diferentes que, en ocasiones, no han incluido un grupo de comparación<sup>10,11,12</sup> o diferente resultado clínico como objetivo primario del estudio porque los autores han utilizado el embarazo clínico como la principal medida de resultado.<sup>13,14</sup> Una revisión sistemática sugirió que la continuación con la fertilización *in vitro* puede ofrecer mayor probabilidad de lograr un embarazo clínico;<sup>15</sup> sin embargo, la revisión tiene varias limitaciones: 1) no utilizó la tasa de nacido vivo como resultado primario; 2) incluyó estudios efectuados en pacientes con otro diagnóstico además de baja respuesta ovárica; 3) algunos de los estudios incluidos solo analizaron pacientes que alcanzaron la transferencia de embriones, lo que podría tergiversar los resultados a favor de la fertilización *in vitro*; y 4) no realizó un metanálisis de los resultados.

Con base en lo anterior, así como la falta de evidencia sustancial de revisiones sistemáticas que evalúen el papel de la fertilización *in vitro* frente a la conversión del ciclo a inseminación intrauterina, nos propusimos realizar la primera revisión sistemática y metanálisis con el objetivo de comparar la continuación con una fertilización *in vitro* vs convertir el ciclo en una inseminación intrauterina en mujeres con baja respuesta ovárica, revisando los mejores datos disponibles hasta la fecha para determinar qué estrategia se asocia con mayor probabilidad de tasa de nacidos vivos.

## METODOLOGÍA

El estudio se adhirió a las pautas de informes preferidos para revisiones sistemáticas y metanálisis (PRISMA).<sup>16</sup> El protocolo del estudio se registró en <http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/CRD42020187820> antes de comenzar la revisión. Este estudio estuvo exento de la aprobación de la junta de revisión institucional porque se trata de una revisión sistemática.

### Criterios de elegibilidad

El modelo PICO (pacientes, intervención, comparación y resultados) se utilizó para seleccionar la población de estudio.<sup>17</sup> Se incluyeron mujeres-parejas que recibieron una fertilización *in vitro* que resultó en baja respuesta ( $\leq 4$  folículos) y que se decidió comparar la tasa de nacidos vivos continuando con la captura ovocitaria *versus* la conversión del ciclo en inseminación intrauterina.

### Estrategia de búsqueda

La búsqueda se emprendió en estudios apropiados para la pregunta clínica en MEDLINE, ClinicalTrials.gov, PubMed, Google Scholar y Cochrane Library (<http://www.cochranelibrary.com>). Se hizo una combinación de términos MeSH o palabras clave relevantes para comparar la tasa de nacidos vivos de fertilización *in vitro* vs inseminación intrauterina en pacientes con baja respuesta a una estimulación ovárica. Los autores también verificaron citas en la Web of Science y buscaron manualmente las referencias de los artículos. Las búsquedas fueron coordinadas en mayo 2020. Las actualizaciones de búsqueda se efectuaron en agosto 2020. Todos los registros fueron evaluados para la elegibilidad por dos revisores independientes. Se incluyeron todos los artículos originales revisados por pares, independientemente del diseño del estudio.



Las estrategias de búsqueda electrónica en la base de datos incluyeron un modelo combinado de términos: (“Ovulation Induction” o “ovarian stimulation” o “ovarian hyperstimulation” or (COH)OR(COS)) and (“Low respon\*” o “Poor ovarian respon\*” o “Low Follicle number\*”) y (“Fertilization in Vitro” o “in vitro fertilization” o (IVF) o “Reproductive Techniques, Assisted” o “Oocyte Retrieval” o “Egg Collection”) y (“Insemination, Artificial” o “Intrauterine Insemination” o (Insemination) o (IUI)) y (“Live Birth Rate” o “Live Birth” o “Pregnancy Outcome” o “Pregnancy” o “Treatment Outcome” o “Infant, Newborn” o “Birth Rate” o “Live-Birth”).

### Selección de estudios

Dos revisores evaluaron de forma independiente los títulos y resúmenes. Las duplicaciones se eliminaron con el programa en línea Zotero y manualmente. Las decisiones finales de inclusión-exclusión se tomaron al examinar los artículos en su totalidad. Las discrepancias se resolvieron mediante discusión y consenso entre los autores, con la participación de otro autor. Para adquirir el mayor nivel de evidencia, los autores seleccionaron ensayos aleatorios y estudios observacionales, incluidos estudios de cohortes y de casos y controles. Los ensayos publicados solo como resúmenes, cartas al editor, editoriales o estudios retirados de la bibliografía después de su publicación se excluyeron. Las revisiones sistemáticas también se excluyeron, pero las referencias se verificaron primero.

Los estudios de intervención fueron elegibles si: 1) eran ensayos controlados aleatorios, no aleatorios, estudios observacionales prospectivos o estudios de cohortes; 2) evaluaron la conversión a inseminación intrauterina vs la continuación con fertilización *in vitro*; 3) con cualquier tipo de protocolo de estimulación (agonista largo, antagonista, *microflare*, *prim-*

*ing* con estrógenos, etc.); y 4) recolectó la tasa de nacidos vivos.

### Recolección de datos

Si los registros eran elegibles, dos revisores recopilaron e importaron sistemáticamente los datos en una base de datos electrónica utilizando campos de datos predefinidos y los recopilaron en un formulario de extracción de datos estandarizado. Esto incluyó los siguientes datos: año de publicación, diseño del estudio, periodo de estudio, intervención, cantidad de pacientes (total, intervención y comparador), edad, FSH basal, AMH basal, folículos antrales, concentraciones de estradiol el día de la descarga, grosor endometrial, dosis total de gonadotropinas, días de estimulación, medicamento de la descarga, tasa de embarazo clínico, tasa de nacidos vivos, tasa de aborto, tasa de embarazo múltiple, tasa de embarazo ectópico; y en los casos de fertilización *in vitro*, tasa de no transferencia embrionaria. Además, para los estudios de intervención también se registraron el ocultamiento de la asignación y el cegamiento. En el caso de publicaciones múltiples, se extrajo la información más actualizada o completa.

El objetivo primario de este metanálisis fue la tasa de nacidos vivos. Como objetivos secundarios se estudiaron la tasa de embarazo bioquímico, la tasa de embarazo clínico, la tasa de aborto, la tasa de embarazo múltiple, la tasa de embarazo ectópico y la tasa de no transferencia embrionaria. Un nacido vivo se definió como cualquier nacimiento de un producto de la concepción vivo mayor de 24 semanas de gestación. La tasa de nacidos vivos se definió como la proporción de nacidos vivos en relación con las pacientes incluidas. Un embarazo bioquímico se definió como la coexistencia en sangre a una concentración mayor de 5 mIU/mL de la fracción beta de hCG posterior a una transferencia de embriones. La

tasa de embarazo bioquímico es la proporción de embarazos bioquímicos en relación con las pacientes incluidas. Un embarazo clínico es la visualización de un saco gestacional con latido cardíaco posterior a una transferencia de embriones. La tasa de embarazos clínicos en relación con las pacientes incluidas. Un aborto es la pérdida de un embarazo de menos de 20 semanas de gestación. La tasa de aborto es la proporción de abortos en relación con la cantidad de embarazos confirmados. Un embarazo múltiple es la visualización de 2 o más sacos gestacionales con latido cardíaco posterior a una transferencia embrionaria. La tasa de embarazo múltiple es la proporción de embarazos múltiples en relación con las pacientes incluidas. Un embarazo ectópico es la visualización de un saco gestacional fuera de la cavidad uterina. La tasa de embarazo ectópico es la proporción de embarazos ectópicos en relación con las pacientes incluidas. La no transferencia embrionaria son los ciclos de fertilización *in vitro* sin embriones disponibles para ser transferidos. La tasa de no transferencia embrionaria es la proporción de pacientes sin transferencia embrionaria en relación con las pacientes incluidas en el brazo que continuaron con fertilización *in vitro*.

#### Evaluación de la certeza de la calidad y del riesgo de sesgo

Dos autores evaluaron de forma independiente el sesgo de riesgo de cada estudio. La puntuación de la escala Newcastle-Ottawa (NOS) se usó para evaluar los estudios de casos y controles o de cohortes y el juicio para cada uno se aprobó según tres aspectos: selección del grupo de estudio, comparabilidad entre grupos y la determinación de resultados y exposiciones de interés.<sup>18</sup> Esta escala otorga hasta 9 estrellas a cada estudio y las clasifica en: calidad baja (0 a 4 estrellas), moderada (5 a 6 estrellas) y alta calidad (7 a 9 estrellas).<sup>19</sup>

La evaluación la hicieron en forma independiente dos revisores, mientras que cualquier desacuerdo se resolvió mediante discusión entre las dos partes o al incluir un tercer revisor.

#### Análisis de los datos

Los resultados clínicos se recopilaron como datos dicotómicos. Los resultados de los estudios se combinaron en el metanálisis utilizando un modelo de efectos fijos de Mantel-Haenszel para una razón de momios (*odds ratio* (OR)) agrupada en el IC95%. Si la información estaba disponible, se efectuaba un subanálisis conforme a la cantidad de folículos observados el día de la descarga ovulatoria: 1, 2, 3 ó 4 folículos. Las gráficas tipo *forest plot* y la estadística  $I^2$  se calcularon para cada resultado del estudio para cada grupo como forma de cuantificar la heterogeneidad estadística de los estudios incluidos.<sup>20</sup> La  $I^2$  se definió como: 0 a 40%: puede que no sea importante; 30 a 60%: heterogeneidad moderada; 50 a 90%: heterogeneidad sustancial; 75 a 100%: heterogeneidad considerable.<sup>21,22</sup> Todos los análisis se realizaron con RevMan 5.4 (Review Manager [programa informático], versión 5.4, The Cochrane Collaboration, 2020).

## RESULTADOS

#### Estudios incluidos para revisión y características (Cuadro 1)

La búsqueda bibliográfica recuperó 28 citas, de las que 18 fueron elegibles para consideración después de la selección de títulos y resúmenes. De estos, 6 estudios cumplieron los criterios de inclusión de la revisión sistemática, publicados entre 2009 y 2014.<sup>23-28</sup> La verificación de referencias cruzadas resultó en una inclusión adicional de un artículo: Elzeiny y su grupo<sup>29</sup> no se identificó en la búsqueda porque el título refiere que se llevó a cabo en pacientes con infertilidad idiopática o factor masculino leve;

**Cuadro 1.** Características de los estudios que cumplieron con los criterios de inclusión para la revisión sistemática

Estudio	Diseño del estudio	Definición de baja respuesta ovárica	Criterios	Fertilización <i>in vitro</i> (n)	Inseminación intrauterina (n)	Edad fertilización <i>in vitro</i> vs inseminación intrauterina	FSH basal fertilización <i>in vitro</i> vs inseminación intrauterina	Día de transferencia	Pacientes con transferencia de embrión en fertilización <i>in vitro</i>
Shahine et al <sup>23</sup>	Retrospectivo	≤ 4 folículos	≥ 1 salpinge	170	50	40.2 vs 40.4, NS	13.2 vs 11.5, NS	-	75.9% (129 de 170)
Norian et al <sup>24</sup>	Retrospectivo	≤ 4 folículos	Primer ciclo, E <sup>2</sup> < 1000, ≥ 1 salpinge, ≥ 5 millones de espermatozoides	167	269	36.9 vs 37.0, NS	12.2 vs 10.2, p < 0.05	3, 5	91.6% (153 de 167)
Nicopoullos et al <sup>25</sup>	Retrospectivo	≤ 2 folículos	Respuesta ≤ 2 folículos	807	248	39.6 vs 39.3, NS	11.9 vs 11.2, NS	2, 3, 5	64.7% (522 de 807)
Shohieb et al <sup>26</sup>	Retrospectivo	≤ 4 folículos	E <sup>2</sup> < 1000, ≥ 1 salpinge, ≥ 5 millones de espermatozoides	152	68	36.3 vs 36.4, NS	8.2 vs 7.7, p < 0.05	3	-
Reichman et al <sup>27</sup>	Retrospectivo	≤ 3 folículos	≥ 1 salpinge, ≥ 1 millón de espermatozoides	624	474	39.7 vs 39.9, NS	11.4 vs 11.5, NS	3	90.5% (565 de 624)
Quinquin et al <sup>28</sup>	Retrospectivo	≤ 2 folículos	≤ 40 años, RFA < 7, AMH < 1.1	184	141	36.8 vs 36.6, NS	9.5 vs 10.2, NS	2, 3	56.0% (103 de 184)
Elzeiny et al <sup>29</sup>	RCT	≤ 3 folículos	1 año de infertilidad, menos de 42 años, primer tratamiento	11	33	34.0 vs 33.0, NS	-	3	81.8% (9 de 11)

\*n: tamaño de la muestra; NS: sin significación estadística; RFA: recuento de folículos antrales; esp: RCT: randomized controlled trial.




sin embargo, al revisar el artículo, solo se incluyeron pacientes con respuesta a la estimulación ovárica convencional de 2 o 3 folículos, que justo es la definición de baja respuesta ovárica,<sup>4</sup> por eso se incluyó en la revisión sistemática (**Figura 1**). Se analizaron en total 3398 pacientes (fertilización in vitro 2115; inseminación intrauterina: 1283).

#### Descripción de los estudios

De los estudios incluidos, seis son retrospectivos y uno aleatorizado controlado.<sup>29</sup> Tres estudios son de Estados Unidos,<sup>23,24,27</sup> uno del Reino Unido,<sup>25</sup> uno de Arabia Saudita,<sup>26</sup> uno de Australia<sup>29</sup> y uno de Francia.<sup>28</sup>

La definición de baja respuesta varió entre 2 a 4 folículos, 12 a 16 mm (diámetro medio) el día de la administración de hCG. Se utilizó la definición de menos de 4 folículos en 3 estudios,<sup>23,24,26</sup> menos de 3 en 2 estudios<sup>27,29</sup> y menos de 2 en 2 estudios.<sup>25,28</sup> Dos estudios utilizaron valores de estradiol de 1000 pg/mL como criterios adicionales. Solo un estudio utilizó los criterios de Bolonia para baja respuesta ovárica.<sup>28</sup>

Seis estudios informaron la tasa de nacidos vivos como resultado primario y uno como resultado secundario.<sup>29</sup> Tres estudios incluyeron pacientes en protocolo largo de agonista o antagonista,<sup>25,26,27</sup> dos estudios incluyeron todos los protocolos de estimulación,<sup>23,28</sup> y dos estudios solo de ciclos an-



**Figura 1.** Selección de los estudios incluidos según los elementos de PRISMA.



tagonistas.<sup>24,29</sup> Solo cuatro estudios especificaron que al menos una trompa de Falopio tenía que ser permeable para poder sugerir conversión a inseminación intrauterina.<sup>23,24,26,27</sup>

#### Riesgo de sesgo en los estudios incluidos

De acuerdo con las guías sugeridas por la *Cochrane Collaboration*, la calidad de la mayor parte de los estudios incluidos fue moderada.

#### Comparación de la tasa de nacido vivo

Los siete estudios incluyeron 3398 pacientes-ciclos, con 2115 ciclos de fertilización *in vitro* y 1283 de inseminación intrauterina. La tasa de nacidos vivos para todos los estudios juntos fue de 9.2% (195 de 2115) en fertilización *in vitro* vs 3.7% (47 de 1283) en inseminación intrauterina (**Cuadro 2**). En general, todos reportan una tasa de nacidos vivos más alta en fertilización *in vitro* que con inseminación intrauterina. Solo hay un estudio prospectivo aleatorizado controlado. Elzeiny y colaboradores<sup>29</sup> reportaron una tasa de nacidos vivos en fertilización *in vitro* de 36.4 vs 6.1% en inseminación intrauterina. Este resultado es el que más peso tiene al ser el único estudio prospectivo con asignación al azar controlado de toda la revisión.

El metanálisis de los estudios incluidos mostró que la continuación con la fertilización *in vitro* proporciona 3.15 veces más probabilidades de lograr un nacido vivo vs la conversión del ciclo en una inseminación intrauterina (OR combinado 3.15 (IC95%: 2.26 a 4.41)). **Figura 2a**

#### Comparación de la tasa embarazo clínico

Los siete estudios reportaron la tasa de embarazos bioquímicos, que para todos los estudios fue de 12.6% (267/2115) en fertilización *in vitro* vs 5.7% (73/1283) en inseminación intrauterina.

#### Cuadro 2

**Cuadro 2.** Comparación de los resultados clínicos de los estudios incluidos.

	Tasa de embarazo bioquímico	Tasa de embarazo clínico	Fertilización <i>in vitro</i>	Inseminación intrauterina	Fertilización <i>in vitro</i>	Inseminación intrauterina	Fertilización <i>in vitro</i>	Inseminación intrauterina	Tasa de aborto	Tasa de nacido vivo
Shahine et al <sup>23</sup>	-	-	10.0% (17/170)	8.0% (4/50)	29.4% (5/17)	25.0% (1/4)	7.1% (12/170)	6.0% (3/50)		
Norian et al <sup>24</sup>	-	-	25.7% (43/167)	5.2% (14/269)	23.4% (10/43)	21.4% (3/14)	19.8% (33/167)	4.1% (11/269)		
Nicopoulos et al <sup>25</sup>	13.0% (105/807)	4.8% (12/248)	8.1% (65/807)	3.6% (9/248)	16.9% (11/65)	44.4% (4/9)	6.7% (54/807)	2.0% (5/248)		
Shohieb et al <sup>26</sup>	9.2% (14/152)	10.3% (7/68)	17.1% (26/152)	10.3% (7/68)	34.6% (9/26)	28.6% (2/7)	11.2% (17/152)	7.4% (5/68)		
Reichman et al <sup>27</sup>	21.6% (135/624)	7.4% (35/474)	13.9% (87/624)	4.6% (22/474)	43.0% (58/135)	45.7% (16/35)	9.3% (58/624)	3.4% (16/474)		
Quinquin et al <sup>28</sup>	16.8% (31/184)	10.6% (15/141)	13.6% (25/184)	9.2% (13/141)	-	-	9.2% (17/184)	3.6% (5/141)		
Elzeiny et al <sup>29</sup>	45.5% (5/11)	12.1% (4/33)	36.4% (4/11)	12.1% (4/33)	20.0% (1/5)	25.0% (1/4)	36.4% (4/11)	6.1% (2/33)		
Todos	16.3% (290/1778)	7.6% (73/964)	12.6% (267/2115)	5.7% (73/1283)	32.3% (94/291)	37.0% (27/73)	9.2% (195/2115)	3.7% (47/1283)		

La continuación de la fertilización in vitro confiere 2.84 veces más probabilidades de lograr un embarazo clínico vs una inseminación intrauterina (OR 2.84 [IC95%: 2.15-3.74]). **Figura 2b**

#### **Comparación de la tasa de embarazo bioquímico**

Cinco estudios informaron la tasa de embarazo bioquímico,<sup>25,29</sup> con un total de 1778 pacientes-ciclos en fertilización in vitro y 964 en inseminación intrauterina (**Cuadro 2**). La tasa de embarazo bioquímico en Shohieb y coautores<sup>26</sup> se reportó más baja que la tasa de embarazos bioquímicos, lo que quizá sea un error. Puesto que la tasa de embarazo bioquímico no fue el resultado primario de este metanálisis, no se intentó contactar a los autores para obtener aclaraciones.

La continuación con fertilización in vitro tiene 2.72 veces más probabilidades de lograr un embarazo bioquímico vs una inseminación intrauterina (OR 2.72 [IC95%: 2.06-3.58]). **Figura 2c**

#### **Comparación de la tasa de aborto**

Seis estudios reportaron la tasa de aborto.<sup>23-27,29</sup> El análisis combinado de los estudios enseña una tasa de aborto de 23.1% (36 de 156) para fertilización in vitro y de 31.6% (12 de 38) para inseminación intrauterina. **Cuadro 2**

Los datos muestran que la continuación de la fertilización in vitro tiene un 17% menos de probabilidades de terminar en aborto, aunque esto no fue estadísticamente significativo (OR 0.83 [IC95%: 0.48 a 1.43]). **Figura 3A**

#### **Comparación de la tasa de embarazo múltiple**

Solo 2 estudios reportaron tasa de embarazo múltiple. Norian y su grupo<sup>24</sup> reportaron 38.9% de embarazos gemelares en fertilización in vitro

vs 21.4% en inseminación intrauterina y Elzeiny y colaboradores<sup>29</sup> reportaron 0% en fertilización in vitro vs 25% en inseminación intrauterina (**Cuadro 2**). Al comparar la probabilidad de un embarazo múltiple, ambas estrategias son similares: OR 1.37 (IC95%: 0.40-4.72). **Figura 3b**

#### **Comparación de la tasa de embarazo ectópico**

De los estudios seleccionados, solo Norian y coautores<sup>24</sup> reportaron la posibilidad de embarazo ectópico que fue de 1.2% para fertilización in vitro y de 0% para inseminación intrauterina. No hay diferencia estadísticamente significativa (**Cuadro 3**) (OR 8.14 [IC95%: 0.39-170.64]) **Figura 3c**


#### **Evaluación de la tasa de no transferencia embrionaria**

Seis estudios reportaron la cantidad de pacientes que tuvieron una transferencia de embriones.<sup>23,24,25,27,28,29</sup> El 70.7% (1387 de 1963) de las pacientes que optaron por continuar con la captura folicular tuvieron transferencia (**Cuadro 3**). En cuanto a la posibilidad de captura folicular negativa, 4 estudios reportaron este escenario.<sup>24,25,27,29</sup> Un 7.1% (116/1609) de las pacientes no obtuvieron ovocitos en la captura.

#### **Evaluación por respuesta folicular**

##### **Un folículo**

Tres estudios informaron desenlaces según si se observó respuesta monofolicular.<sup>24,27,28</sup> Los resultados agrupados mostraron una tasa de nacidos vivos de 3.6% con fertilización in vitro vs 2.7% con inseminación intrauterina (**Cuadro 4**). El metanálisis de la tasa de nacidos vivos de estos estudios no mostró diferencias entre las estrategias (OR 1.02 [IC95%: 0.37-2.84]). **Figura 4a**



**Figura 2.** Gráfica tipo forest plot de la comparación de continuar con fertilización *in vitro* vs convertir a inseminación intrauterina en pacientes con baja respuesta ovárica. Análisis: **a)** Tasa de nacido vivo; **b)** Tasa de embarazo clínico; **c)** Tasa de embarazo bioquímico. Figura del autor.

### Dos folículos

Tres estudios informaron desenlaces cuando se observaron 2 folículos.<sup>24,27,28</sup> La continuación con fertilización *in vitro* mostró una tasa de nacidos vivos combinada del 9.6 vs 2.6% en la inseminación intrauterina (**Cuadro 4**). Un metanálisis de estos estudios mostró que la continuación de la fertilización *in vitro* tiene 3.61 veces más


probabilidades de lograr un nacido vivo que la inseminación intrauterina (OR 3.61 [IC95%: 1.54-8.43]) (**Figura 4b**).

### Tres folículos

Dos estudios informaron desenlaces en pacientes con una respuesta de tres folículos<sup>24,27</sup> y la continuación de la fertilización *in vitro* mostró

**Cuadro 3.** Desenlaces clínicos adversos.

	Tasa de ciclos con transferencia embrionaria	Tasa de embarazo múltiple		Tasa de embarazo ectópico	
	Fertilización in vitro	Fertilización in vitro	Inseminación intrauterina	Fertilización in vitro	Inseminación intrauterina
Shahine et al <sup>23</sup>	75.9% (129/170)	-	-	-	-
Norian et al <sup>24</sup>	91.6% (153/167)	34.9% (15/43)	21.4% (3/14)	1.2% (2/167)	0% (0/269)
Nicopoullos et al <sup>25</sup>	64.7% (522/807)	-	-	-	-
Shohieb et al <sup>26</sup>	-	-	-	-	-
Reichman et al <sup>27</sup>	90.5% (565/624)	-	-	-	-
Quinquin et al <sup>28</sup>	56.0% (103/184)	-	-	-	-
Elzeiny et al <sup>29</sup>	81.8% (9/11)	0% (0/5)	25.0% (1/4)	-	-
Todos	75.4% (1481/1963)	31.3% (15/48)	22.2% (4/18)	1.2% (2/167)	0% (0/269)



\*IVF: fertilización in vitro; IUI: inseminación intrauterina; POR: siglas en inglés de baja respuesta ovárica; PR: siglas en inglés de tasa de embarazo bioquímico.

**Figura 3.** Gráfica tipo forest plot de la comparación de continuar con fertilización in vitro vs convertir a inseminación intrauterina en pacientes con baja respuesta ovárica. Análisis: a) Tasa de aborto; b) Tasa de embarazo múltiple; c) Tasa de embarazo ectópico. Figura del autor.



**Cuadro 4.** Tasa de nacido vivo por respuesta folicular, por estudio individual y todos juntos.

Autor	Tasa de nacido vivo						
	1 folículo	Inseminación intrauterina	2 folículos	Inseminación intrauterina	3 folículos	4 folículos	
Fertilización in vitro		Fertilización in vitro	Inseminación intrauterina	Fertilización in vitro	Inseminación intrauterina	Fertilización in vitro	Inseminación intrauterina
Shahine et al <sup>23</sup>	Sin resultado	Sin resultado	Sin resultado	Sin resultado	Sin resultado	Sin resultado	Sin resultado
Norian et al <sup>24</sup>	0% (0/2)	0% (0/67)	6.3% (1/16)	2.0% (2/98)	20.0% (8/40)	7.1% (5/70)	22.0% (24/109) 11.8% (4/34)
Nicopoullos et al <sup>25</sup>	Sin resultado	Sin resultado	Sin resultado	Sin resultado	Sin resultado	Sin resultado	Sin resultado
Shohieb et al <sup>26</sup>	Sin resultado	Sin resultado	Sin resultado	Sin resultado	Sin resultado	Sin resultado	Sin resultado
Reichman et al <sup>27</sup>	2.9% (3/104)	2.6% (7/267)	8.7% (18/208)	3.4% (5/146)	11.9% (37/312)	6.6% (4/61)	Sin resultado
Quinquin et al <sup>28</sup>	4.8% (3/63)	5.1% (4/78)	11.6% (14/121)	1.6% (1/63%)	Sin resultado	Sin resultado	Sin resultado
Elzeiny et al <sup>29</sup>	Sin resultado	Sin resultado	Sin resultado	Sin resultado	Sin resultado	Sin resultado	Sin resultado
Todos	3.6% (6/169)	2.7% (11/412)	9.6% (33/345)	2.6% (8/307)	12.8% (45/352)	6.9% (9/131)	22.0% (24/109) 11.8% (4/34)


una tasa de nacido vivo agrupada de 12.8% vs 6.9% en inseminación intrauterina (**Cuadro 4**). El metanálisis de estos estudios mostró que la continuación de la fertilización in vitro tiene 2.36 veces más probabilidades de lograr un nacido vivo que la inseminación intrauterina (OR 2.36 [IC95%: 1.04-5.33]). **Figura 4C**

## *Cuatro folículos*

Un solo estudio analizó los desenlaces cuando se observaron 4 folículos durante la estimulación,<sup>24</sup> y los autores informaron un 22% de tasa de nacido vivo en fertilización *in vitro* versus 11.8% en inseminación intrauterina ( $p = 0.19$ ). **Cuadro 4**

## DISCUSIÓN

Esta revisión sistemática resume la información disponible en relación con la tasa de nacidos vivos en pacientes con baja respuesta a una estimulación ovárica controlada durante una fertilización in vitro. Continuamente nos encontramos con la difícil decisión de aconsejar a una paciente qué hacer cuando se evidencia la baja respuesta a la estimulación. Entre las diferentes variables que deben tomarse en cuenta, la más importante es la posibilidad de éxito al decidirse por un tratamiento. Al analizar, en conjunto, los desenlaces de todos los estudios, se advierte que continuar con la fertilización in vitro confiere una tasa de nacidos vivos de 9.2% vs 3.7% en inseminación intrauterina. Con estos datos es evidente que la continuación a la captura folicular y transferencia de embriones se consideraría la mejor opción desde el punto de vista médico en pacientes con baja respuesta ovárica. El análisis por respuesta ovárica permite ver que, en los casos de respuesta de un solo folículo, la tasa de nacido vivo es similar, por lo que el consejo es convertir el ciclo a inseminación intrauterina porque no implica un procedimiento quirúrgico ni anestesia. Esta información se recopiló de 7 estudios que reunían a 3398 pacientes.



**Figura 4.** Gráfica tipo forest plot de la comparación de continuar con fertilización in vitro vs convertir a inseminación intrauterina en pacientes con baja respuesta ovárica. Análisis: tasa de nacidos vivos de acuerdo con la respuesta folicular de a) 1 folículo, b) 2 folículos c) 3 folículos. Figura del autor.

Encontrar una baja respuesta ovárica durante la estimulación siempre es decepcionante en virtud de que el pronóstico cambia de manera muy importante.<sup>3</sup> Con frecuencia nos encontramos ante una paciente con esta situación; realmente no teníamos números específicos para ayudar a guiar a nuestras pacientes. Con los desenlaces de este estudio, ahora puede darse respuesta con probabilidades específicas a una paciente que se encuentra en este escenario.

La siguiente variable a valorar es el costo y el costo-efectividad de una estrategia *versus* la otra.

Desafortunadamente, solo el estudio de Elzeiny y colaboradores<sup>29</sup> incluyó un análisis económico. En su estudio, los autores reportaron el costo de un nacido vivo por inseminación intrauterina 4 veces más alto que por fertilización in vitro.<sup>29</sup> Se necesitan más estudios para poder hacer una extrapolación a nuestro medio.

Éste es el primer estudio de revisión bibliográfica que agrupa datos de los desenlaces del embarazo en pacientes con baja respuesta ovárica llevadas a fertilización in vitro. En segundo lugar, se hizo un análisis exhaustivo de la bibliografía y de los



datos para minimizar el riesgo de error. En tercer lugar, al analizar por subgrupos se identificó que no en todos los escenarios proceder con la fertilización *in vitro* es la mejor opción disponible.

Existen limitaciones en los datos analizados en esta revisión. Primero, solo hubo siete estudios que cumplieron con los criterios de inclusión y reportaron la tasa de nacidos vivos, de los que solo uno fue un ensayo controlado con asignación al azar. Si bien la calidad del resto de los estudios es alta (NOS superior a 7), 6 de los revisados son retrospectivos, lo que tiene en cuenta las limitaciones y el sesgo potencial de tal diseño. Los estudios variaron ampliamente en sus métodos y definiciones, lo que condujo a un alto grado de heterogeneidad. Debido a que parte de los criterios de inclusión definidos era el reporte de la tasa de nacidos vivos, se descartaron tres potenciales artículos.

A pesar de estas limitaciones, el resumen de estos estudios aún aporta información valiosa para el médico y la paciente en estas situaciones clínicas difíciles. Se requieren más estudios para determinar si económicamente una estrategia es superior a la otra. Sin embargo, desde el punto de vista médico, la continuación con fertilización *in vitro* se asocia con mayor éxito clínico.

## CONCLUSIONES

Lo hasta aquí revisado sugiere que la continuación con fertilización *in vitro* conduce a una tasa de nacidos vivos más alta *versus* la conversión a inseminación intrauterina en pacientes con respuesta baja, con  $\leq 5$  folículos, excepto en quienes responden con un solo folículo, en mujeres en las que la inseminación intrauterina parece más razonable en virtud de la posibilidad de que el hecho de tener un hijo en casa es similar y no se asocia con los riesgos y costos de un procedimiento de fertilización *in vitro*.

## FINANCIAMIENTO

Este estudio no necesitó financiamiento de ningún tipo, salvo el auspicio de C de la F.

## REFERENCIAS

1. The European IVF-monitoring Consortium (EIM), for the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Calhaz-Jorge C, et al. Assisted reproductive technology in Europe, 2013: results generated from European registers by ESHRE†. *Hum Reprod.* 2017; 32 (10): 1957-73. doi:10.1093/humrep/dex264.
2. Macklon NS, Stouffer RL, Giudice LC, Fauser BCJM. The Science behind 25 Years of Ovarian Stimulation for *in Vitro* Fertilization. *Endocr Rev.* 2006; 27 (2): 170-207. doi:10.1210/er.2005-0015.
3. Oudendijk JF, Yarde F, Eijkemans MJC, Broekmans FJM, Broer SL. The poor responder in IVF: is the prognosis always poor?: a systematic review. *Hum Reprod Update.* 2012; 18 (1): 1-11. doi:10.1093/humupd/dmr037.
4. Ferraretti AP, La Marca A, Fauser BCJM, et al. ESHRE consensus on the definition of “poor response” to ovarian stimulation for *in vitro* fertilization: the Bologna criteria. *Hum Reprod.* 2011; 26 (7): 1616-24. doi:10.1093/humrep/der092.
5. Veleva Z, Järvelä IY, Nuojua-Huttunen S, Martikainen H, Tapanainen JS. An initial low response predicts poor outcome in *in vitro* fertilization/intracytoplasmic sperm injection despite improved ovarian response in consecutive cycles. *Fertil Steril.* 2005; 83 (5): 1384-90. doi:10.1016/j.fertnstert.2004.11.056.
6. Maheshwari A, Stofberg L, Bhattacharya S. Effect of overweight and obesity on assisted reproductive technology--a systematic review. *Hum Reprod Update.* 2007; 13 (5): 433-44. doi:10.1093/humupd/dmm017.
7. Simoni M, Nieschlag E, Gromoll J. Isoforms and single nucleotide polymorphisms of the FSH receptor gene: implications for human reproduction. *Hum Reprod Update.* 2002; 8 (5): 413-21. doi:10.1093/humupd/8.5.413.
8. Galey-Fontaine J, Cédrin-Durnerin I, Chaïbi R, Massin N, Hugues J-N. Age and ovarian reserve are distinct predictive factors of cycle outcome in low responders. *Reprod Biomed Online.* 2005; 10 (1): 94-99. doi:10.1016/s1472-6483(10)60808-5.
9. Saldeen P, Källen K, Sundström P. The probability of successful IVF outcome after poor ovarian response. *Acta Obstet Gynecol Scand.* 2007; 86 (4): 457-61. doi:10.1080/00016340701194948.
10. Matorras R, Corcóstegui B, Mendoza R, et al. Converting an IVF cycle to IUI in low responders with at least 2 follicles. *J Reprod Med.* 2003; 48 (10): 789-91.

11. Lashen H, Ledger W, Lopez-Bernal A, Barlow D. Poor responders to ovulation induction: is proceeding to in-vitro fertilization worthwhile? *Hum Reprod Oxf Engl.* 1999; 14 (4): 964-69. doi:10.1093/humrep/14.4.964.
12. Abusheikha N, Lass A, Burnley A, Brinsden P. In vitro fertilization cycles converted to intrauterine insemination because of poor follicular response have low success rates. *Fertil Steril.* 2001; 75 (3): 634-35. doi:10.1016/s0015-0282(00)01739-8.
13. Freour T, Dubourdieu S, Mirallie S, Langlois ML, Jean M, Barrière P. IVF conversion to IUI in poor responders: an observational study. *Arch Gynecol Obstet.* 2010; 282 (4): 445-49. doi:10.1007/s00404-010-1515-0.
14. Wood S, Rahim R, Searle T, et al. Optimal treatment for poor responders to ovarian stimulation: does in vitro insemination offer any advantages to intrauterine insemination? *Hum Fertil Camb Engl.* 2003; 6 (1): 13-18. doi:10.1080/1464770312331368923.
15. Fujii DT, Quesnell JL, Heitmann RJ. Conversion to IUI versus continuance with IVF in low responder patients: A systematic review. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2018; 227: 35-40. doi:10.1016/j.ejogrb.2018.05.032.
16. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, PRISMA Group. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *J Clin Epidemiol.* 2009; 62 (10): 1006-12. doi:10.1016/j.jclinepi.2009.06.005.
17. Schardt C, Adams MB, Owens T, Keitz S, Fontelo P. Utilization of the PICO framework to improve searching PubMed for clinical questions. *BMC Med Inform Decis Mak.* 2007; 7: 16. doi:10.1186/1472-6947-7-16.
18. Hartling L, Hamm M, Milne A, et al. Validity and Inter-Rater Reliability Testing of Quality Assessment Instruments. Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2012. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92293/>.
19. Wells GA, Shea B, O'Connell D, et al. The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of nonrandomised studies in meta-analyses [webpage on the Internet]. Ottawa, ON: Ottawa Hospital Research Institute; 2011. [http://www.ohri.ca/programs/clinical\\_epidemiology/oxford.asp](http://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp).
20. Committee on Standards for Systematic Reviews of Comparative Effectiveness Research, Board on Health Care Services, Institute of Medicine. Finding What Works in Health Care: Standards for Systematic Reviews. (Eden J, Levit L, Berg A, Morton S, eds.). National Academies Press; 2011: 13059. doi:10.17226/13059.
21. Higgins JPT, Thompson SG. Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. *Stat Med.* 2002; 21 (11): 1539-58. doi:10.1002/sim.1186.
22. Higgins JPT, Altman DG, Gotzsche PC, et al. The Cochrane Collaboration's tool for assessing risk of bias in randomised trials. *BMJ.* 2011; 343: d5928-d5928. doi:10.1136/bmj.d5928.
23. Shahine LK, Lathi RB, Baker VL. Oocyte retrieval versus conversion to intrauterine insemination in patients with poor response to gonadotropin therapy. *Fertil Steril.* 2009; 92 (4): 1315-17. doi:10.1016/j.fertnstert.2009.03.059.
24. Norian JM, Levens ED, Richter KS, Widra EA, Levy MJ. Conversion from assisted reproductive technology to intrauterine insemination in low responders: is it advantageous? *Fertil Steril.* 2010; 94 (6): 2073-77. doi:10.1016/j.fertnstert.2009.12.056.
25. Nicopoullos JDM, Abdalla H. Poor response cycles: when should we cancel? Comparison of outcome between egg collection, intrauterine insemination conversion, and follow-up cycles after abandonment. *Fertil Steril.* 2011; 95 (1): 68-71. doi:10.1016/j.fertnstert.2010.05.030.
26. Shohieb A, Mostafa M, El-Khayat W. Conversion of ICSI cycles to IUI in poor responders to controlled ovarian hyperstimulation. *Middle East Fertil Soc J.* 2012; 17 (1): 42-46. doi:10.1016/j.mefs.2011.07.005.
27. Reichman DE, Gunnala V, Meyer L, et al. In vitro fertilization versus conversion to intrauterine insemination in the setting of three or fewer follicles: how should patients proceed when follicular response falls short of expectation? *Fertil Steril.* 2013; 100 (1): 94-99. doi:10.1016/j.fertnstert.2013.02.049.
28. Quinquin M, Mialon O, Isnard V, et al. In vitro fertilization versus conversion to intrauterine insemination in Bologna-criteria poor responders: how to decide which option? *Fertil Steril.* 2014; 102 (6): 1596-601. doi:10.1016/j.fertnstert.2014.08.023.
29. Elzeiny H, Garrett C, Toledo M, Stern K, McBain J, Baker HWG. A randomised controlled trial of intra-uterine insemination versus in vitro fertilization in patients with idiopathic or mild male infertility. *Aust N Z J Obstet Gynaecol.* 2014; 54 (2): 156-61. doi:10.1111/ajo.12168.