

Pancreatitis aguda durante el embarazo secundaria a dislipidemia mixta. Reporte de un caso

Félix Fernando León Carrillo,* María Guadalupe Hernández Landeros†

RESUMEN

Femenino de 16 años que cursaba con un embarazo de 17 semanas de gestación al momento de su ingreso al hospital; refería dolor intenso en el epigastrio posterior a transgresión alimentaria, acompañado de náusea, que llegaba a la emesis de contenido gastroalimentario; era portadora de diabetes *mellitus* tipo 1, además de antecedentes de pancreatitis aguda grave secundaria a hiperlipidemia a los 14 años, appendicetomía a los 15 años e infección de vías urinarias en el primer trimestre; se realizaron paracínicos con resultados relevantes, a razón de leucocitos 15,600, amilasa 1,117 U/L, lipasa 1,200 U/L, suero lipémico +++, triglicéridos 2,840, colesterol 705, HDL 20 U/L, DHL 289 U/L, TGO 14 U/L, TGP 6 U/L, FA 60 U/L y bilirrubina total 0.5 pg/dL, con lo cual se llegó al diagnóstico de pancreatitis aguda secundaria a dislipidemia mixta. Dado que se realizaron estudios de laboratorio en los hermanos y la rama femenina fue positiva, con elevación de colesterol y triglicéridos, concluimos que se trataba de una dislipidemia familiar combinada, lo que motivó su publicación.

Palabras clave: Embarazo, pancreatitis, dislipidemia familiar.

SUMMARY

Sixteen-year-old female, with a 17-week pregnancy at the time of admission to the hospital; she referred epigastric pain after food transgression, accompanied by nausea, which reached emesis with gastro-alimentary content; she had diabetes mellitus 1 plus a history of severe acute pancreatitis secondary to hyperlipidemia at age 14, appendectomy at age 15 and a urinary tract infection in the first trimester; paraclinical tests were performed, with the following relevant results: leukocytes 15,600, amylase 1,117, lipase 1,200, lipemic serum +++, triglycerides 2,840, cholesterol 705, HDL 20, DHL 289, SGOT 14, SGPT 6, FA 60 and total bilirubin 0.5 pg/dL, which led to the diagnosis of acute pancreatitis secondary to mixed dyslipidemia. Laboratory tests were performed in her siblings and the female branch was positive, with elevation of cholesterol and triglycerides; therefore we concluded that it was a familial combined dyslipidemia, which motivated its publication.

Key words: Pregnancy, pancreatitis, dyslipidemia.

RESUMO

Feminino de 16 anos com 17 SDG no momento da internação, referindo dor epigástrica após transgressão alimentar acompanhada de náusea e emese de conteúdo gastroalimentário, portadora de DM tipo 3 e antecedente de pancreatite aguda grave secundária a hiperlipidemia aos 14 anos; além de história de pancreatite aguda grave secundária a hiperlipidemia aos 14 anos, appendicetomia aos 15 anos e infecção do trato urinário no primeiro trimestre; foram realizados estudos pré-clínicos com resultados relevantes na proporção de leucócitos 15.600, amilase 1117, lipase 1200, soro lipêmico +++, triglicerídeos 2840, colesterol 705, HDL 20, DHL 289, TGO 14, TGP 6, FA 60 e bilirrubina total 0.5 pg/dL, o que levou ao diagnóstico de pancreatite aguda secundária a dislipidemia mista e o estudo laboratorial realizado em irmãos permanece positivo na rama feminina da família. Concluímos que é uma dislipidemia familiar combinada, motivo de sua publicação.

Palavras-chave: Gravidez, pancreatite, dislipidemia.

INTRODUCCIÓN

Se trató de paciente femenino de 16 años con un embarazo de 17 semanas de gestación (SDG) que acudió al hospital a la presentación de dolor abdominal epigástrico intenso secundario a transgresión dietética (ingesta de colecistoquinéticos), acompañado de vó-

mito y mal estado general. Tenía antecedentes de un cuadro de pancreatitis dos años antes secundario a dislipidemia, diabetes *mellitus* en tratamiento con insulina 15 y 10 U, y appendicectomía un año atrás. Se realizaron paracínicos, con los siguientes hallazgos: suero lipémico +++++. Se ingresó a la unidad de terapia intensiva; se inició el manejo para pancreatitis aguda secundaria a dislipidemia, así como embarazo de 17 SDG por FUM. La pancreatitis es un evento raro durante el embarazo: 1: 1,000 o 1:10,000.¹ La etiología más común es de origen biliar;^{2,3} asociada con dislipidemia es aún más rara, siendo una complicación grave y potencialmente fatal.

CASO CLÍNICO

Paciente primigesta de 16 años, con los siguientes antecedentes: pancreatitis aguda grave secundaria a hiperlipidemia a los 14 años, con estancia hospitalaria de dos meses, con secuela de diabetes *mellitus* tipo 1; dislipidemia con manejo de bezafibrato y pravastatina, con mal apego al tratamiento; quirúrgicos positivos a razón de appendicetomía a los 15 años; resto de los antecedentes, interrogados y negados. Antecedentes ginecoobstétricos: menarca a los 12 años, eumenorreica, inicio de la actividad sexual a los 16 años con una sola pareja; no uso de método de planeación familiar ni detección de cáncer de mama o cervicovaginal; gestas: 01, abortos: 00, partos: 00 y cesáreas: 00. Embarazo actual de 17 semanas de gestación por fecha de última menstruación, infección de vías urinarias en el primer trimestre con tratamiento médico no especificado; control prenatal en cuatro ocasiones.

Inició su padecimiento actual el 7 de enero de 2012 posterior a una transgresión alimentaria (ingesta de alimentos colecistoquinéticos); acudió a consulta en Urgencias Adulto con intenso dolor en el epigastrio acompañado de náusea que llegaba a la emesis de contenido gastroalimentario y luego biliar, acompañado de diaforesis y palidez. Se decidió su ingreso con diagnóstico de enfermedad ácida péptica. Se inició un protocolo de estudios con solicitud de biometría hemática (*Tabla 1*), química sanguínea (*Figura 1* y *Tabla 2*), pruebas funcionales hepáticas (no se obtuvieron de ingreso por suero lipémico) (*Tabla 2*). La exploración abdominal reveló dolor intenso a la palpación en el epigastrio, útero grávido a 17 cm de la sínfisis del pubis, peristalsis disminuida. Se realizó un ultrasonido

* Hospital General de Pachuca, Hidalgo.

† Hospital Regional de Aguascalientes, Ags.

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional, ISSSTE, León, Gto.

Recepción: 23/01/2018. Aceptación: 11/05/2018.

Este artículo puede ser consultado en versión completa en <http://www.medicinacritica.com>

abdominal (no contamos con la imagen, sólo el reporte escrito), con los siguientes hallazgos: páncreas de aspecto adenomatoso, lodo biliar en la vesícula, colédoco y porta no valorables (*Figura 1*). Ultrasonido obstétrico: producto único de 19.5 SDG; frecuencia cardiaca fetal de 156/min; índice de líquido amniótico apreciativamente normal, placenta fúnica anterior. Tras ello se dio el diagnóstico de pancreatitis aguda secundaria a dislipidemia; se solicitó la valoración por la unidad de cuidados intensivos y se aceptó.

Curso y evolución

Se ingresó a las ocho horas en terapia intensiva, donde persistió con acidosis metabólica e hiperlipidemia; se le brindó tratamiento médico a base de ayuno, hidratación parenteral, sonda nasogástrica, bloqueador H₂, analgesia a base de opioide tipo tramadol; no hubo decre-

mento de los triglicéridos y el colesterol, por lo que se decidió programar plasmaférésis dentro de las primeras 48 horas de estancia (*Tabla 3*). Sin embargo, presentó al tercer día reducción de los valores; con apoyo de la valoración del Servicio de Hematología se difirió dicho procedimiento (*Tabla 4*).

Se mantuvo en ayuno, ya que persistía con dolor abdominal; inició la nutrición parenteral sin lípidos; posteriormente, reinició tolerancia a la vía oral, con buena aceptación, así como ausencia de dolor y buena tolerancia a la dieta, sin compromiso obstétrico. Se egresó a hospitalización y 48 horas después se egresó a domicilio por evolución favorable.

Se realizaron estudios de seguimiento familiar, la cual estaba compuesta de siete integrantes (incluida nuestra paciente) de 16 a 25 años de edad, cuatro mu-

Tabla 1: Datos biometría hemática.

	TA	FC	FR	SatO ₂	Temperatura	PVC
Ingreso	120/80	85	16	92%	36	
24 h	110/50	115	22	94%	36.5	3
48 h	120/60	120	19	99%	36	7
5 día	130/60	103	20	93%	36.7	14
8 día	125/60	104	20	94%	36.5	10

Tabla 2: Datos de laboratorio para diagnóstico de pancreatitis grave.

	Hematocrito	Leucocitos
Día 1	41.6 Pérdida >10%	15.6 >16,000/mm ³
Día 2	33.5	8.78
Día 5	30.1	7.07
Día 8	32.6	5.68

Tabla 3: Criterios de ingreso y pronóstico para pancreatitis grave.

Ranson	APACHE	BISAP	ATLANTA	Balthazar
24 h	3	Al ingreso	20	1
			Pancreatitis aguda moderadamente severa	B
48 h	3	48 h	7	

Tabla 4: Datos de Laboratorio de Pancreatitis secundaria a dislipidemia mixta.

	Colesterol	Triglicéridos	Amilasa	Lipasa	DHL	Glucosa
Día 1	705 < 200 mg/dL	2,840 < 150 mg/dL	1,117	1,200	289 > 350 U/L	256
Día 2	507	1,711 < 200 mg/dL	1,735	443	752	240 > 200 mg/dL
Día 3	350	705	262	127	725	120
Día 4	359	659				
Día 5			152	124		150
Día 6	403	676	89	137		257
Día 7	301	502			19	193
Día 8	477	256				187




Figura 1: Páncreas aspecto adenomatoso.

jerés y tres hombres; la madre de 45 años tenía como antecedente de importancia diabetes *mellitus* tipo 2 e insuficiencia renal terminal con manejo sustitutivo hemodiálisis, por lo que concluimos que la familia es portadora de dislipidemia mixta familiar (*Tabla 5*).

DISCUSIÓN

La pancreatitis aguda ocurre en 0.03 a 0.09% de los embarazos. La enfermedad de cálculos biliares es responsable de aproximadamente el 70% de estos casos. En el presente caso se concluyó que la causa fue metabólica, secundaria a dislipidemia;⁴ tenía múltiples factores que la predisponían a desarrollar este evento: primero, la predisposición familiar; el evento previo de pancreatitis; la diabetes *mellitus*; el embarazo y alto riesgo de recurrencia.⁵ Este tipo de padecimiento en la mujer embarazada debe ser manejado por un equipo multidisciplinario para mejorar la evolución, pronóstico y la supervivencia del binomio.⁶

BIBLIOGRAFÍA

1. Pitchumoni CS, Yegneswaran B. Acute pancreatitis in pregnancy. *World J Gastroenterol.* 2009;15(45):5641-5646.
2. Ducarme G, Maire F, Chatel P, Luton D, Hammel P. Acute pancreatitis during pregnancy: a review. *J Perinatol.* 2014;34(2):87-94.
3. Tang SJ, Rodriguez-Frias E, Singh S, Mayo MJ, Jazrawi SF, Sreenarasimhaiah J, et al. Acute pancreatitis during pregnancy. *Clin Gastroenterol Hepatol.* 2010;8(1):85-90.
4. Aguilar-Salinas CA, Huertas A, Tusié MT, Gómez-Pérez FJ, Rull JA. Hiperlipidemia familiar combinada: caracterización en población mexicana. *Rev Endocrinol Nutr.* 2002;10(2):58-62.
5. Briones-Garduño JC, García-Ochoa ED, Zavala-Castillo JC, Campos-Castillo C, Sandoval-Ayala Ol, Briones-Vega CG, et al. Pancreatitis y embarazo. *Rev Asoc Mex Med Crit y Ter Int.* 2014;28(3):159-163.
6. Ntzeros K, Fragiadakis I, Stamatakos M. Acute pancreatitis in pregnancy-Up to Date. *Open J Obstet Gynecol.* 2014;4:81-89.

Patrocinios y conflicto de intereses: Los autores declaramos no haber recibido patrocinio para el presente trabajo ni tener conflicto de intereses.

Correspondencia:

Dra. María Guadalupe Hernández Landeros
Hospital Regional
de Alta Especialidad del Bajío
Blvd. Milenio Núm. 130,
Col. San Carlos la Roncha,
37600, León, Gto.
Tel: 044 (477) 577 6822
E-mail: lupitahdez31@hotmail.com