

Médica Sur

Volumen
Volume 9

Número
Number 3

Julio-Septiembre
July-September 2002

Artículo:

Glioblastoma multiforme

Derechos reservados, Copyright © 2002:
Asociación Médica del American British Cowdray Hospital, AC

Otras secciones de
este sitio:

- 👉 [Índice de este número](#)
- 👉 [Más revistas](#)
- 👉 [Búsqueda](#)

*Others sections in
this web site:*

- 👉 [Contents of this number](#)
- 👉 [More journals](#)
- 👉 [Search](#)



Medigraphic.com

Imágenes en medicina: Glioblastoma multiforme

Dra. Liliana Orozco Corona,* Dr. Javier Lizardi Cervera**

Paciente masculino de 37 años con un padecimiento de 3 semanas de evolución caracterizado por disminución de la agudeza visual del ojo derecho, así como cefalea frontal tipo punzante, de moderada intensidad, con hemianopsia homónima derecha. La campimetría demostró hemianopsia homónima derecha incongruente, probable lesión retroquiasmática a nivel de cintillas ópticas. Se le realizó una resonancia magnética (*Figuras 1 y 2*) la cual mostró una tumoración temporal izquierda que involucra el asta posterior del ventrículo lateral izquierdo. El diagnóstico final fue de un glioblastoma multiforme.

El glioblastoma multiforme puede presentarse con signos clínicos poco específicos y generalmente caracterizados por incremento de la presión intracraneal, por la presencia de una masa ocupativa, conforme va creciendo puede desarrollarse déficit focal. Su curso es rápidamente progresivo y generalmente el tratamiento quirúrgico no puede realizarse en la mayoría de las ocasiones. La tomografía computada o la resonancia magnética con gadolinio son los estudios de imagen de elección para identificar la lesión así como las características de la misma, su localización, el tamaño y su extensión. El pronóstico es malo a corto plazo, sin embargo, la terapia de radiación y quimioterapia pueden prolongar la sobrevida.




Figura 1.




Figura 2.

Figuras 1 y 2. Imágenes por resonancia magnética que muestran una tumoración temporal izquierda que involucra el asta posterior del ventrículo lateral izquierdo.

* Residente de Medicina Interna.
** Subdirección Académica.
Fundación Clínica Médica Sur. México, D.F.

Referencias

1. Chamberlain MC. Practical Guidelines for the treatment of malignant gliomas. *West J Med* 1998;168:114
2. DeAngelis LM . Malignant glioma:who benefits from adjuvant chemotherapy. *Ann Neurol* 1998;44:691
3. Pech IV. Chemotherapy for brain tumors. *Oncology* 1998;12:537.

Correspondencia:
Subdirección Académica.
Tercer Piso de Hospitalización.
Hospital Médica Sur.
Puente de Piedra No. 150
Col. Toriello Guerra CP 14050.
Del. Tlalpan. México, D.F.