



Respuesta

Reply

Carlos Antonio Ruiz-Aguilar,*
Ericka del Carmen Urdapilleta-Herrera,[‡]
Gabriela Lara-Rivas[‡]

*Universidad La Salle Laguna, Gómez
Palacio, Durango, México; [‡]Instituto Nacional
de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío
Villegas, Ciudad de México, México.

Citar como: Ruiz-Aguilar CA, Urdapilleta-Herrera
EC, Lara-Rivas G. Respuesta. COVID-19: nueva
escala para medir su relación estrecha con la
ansiedad. *Neumol Cir Torax.* 2021; 80 (4): 322.
<https://dx.doi.org/10.35366/103462>

Ciertamente los comentarios realizados
por Sakura Basaldua-Cabezudo,¹ José
Córdova-Tello,¹ Andrea Cadillo-Poma¹ son

de gran utilidad y podrán ser considerados
para futuras investigaciones al respecto, no
sin antes valorar la pertinencia de validar
y estandarizar en población mexicana
el instrumento mencionado «escala de
ansiedad por coronavirus: un nuevo ins-
trumento para medir síntomas de ansiedad
asociados al COVID-19».¹

Sin embargo, es importante resaltar
que el instrumento utilizado en nuestro
estudio *Ansiedad en familiares de pa-
cientes con COVID-19 hospitalizados en
el Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias* fue seleccionado a partir
del análisis de su utilidad y del sustento
científico en la literatura disponible, ya
que se debe recordar que los síntomas
identificados por él están basados en los
criterios diagnósticos para trastorno por
ansiedad generalizada.² Por otro lado, la
disponibilidad actual de un instrumento
específico para medir los efectos psicoló-

gicos asociados a la pandemia, tal como
la Escala de Ansiedad por Coronavirus
(CAS, por sus siglas en inglés) obliga a
los profesionales de la salud mental a
validarlo y estandarizarlo en la población
que se desee evaluar.

REFERENCIAS

1. González-Rivera JA, Rosario-Rodríguez A, Cruz-Santos A. Escala de ansiedad por coronavirus: un nuevo instrumento para medir síntomas de ansiedad asociados al COVID-19. *Interacciones.* 2020;6(3):1-7.
2. Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB, Lowe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. *Arch Intern Med.* 2006;166(10):1092-1097. doi: 10.1001/archinte.166.10.1092.

Correspondencia:

Dra. Eryka del Carmen Urdapilleta-Herrera

Correo electrónico: erykau@yahoo.com.mx