

Respuestas a las preguntas del caso clínico de modulación del crecimiento

Publicado en *Orthotips AMOT*; 2013; 9(4): 270-272.

Ana Dolores Zambrano López *

PREGUNTAS

1. ¿Hasta qué edad se considera el *genu valgo* fisiológico?
2. Mencione dos beneficios de la hemiepifisiodesis:
3. Desventajas de la hemiepifisiodesis:
4. Tipo de hemiepifisiodesis:
5. ¿Qué parámetros se deben tomar en cuenta para poder escoger el implante a colocar en una hemiepifisiodesis?

RESPUESTAS

1. De 2 a 6 años.
2. Menos invasiva. Las deformidades multifocales o bilaterales pueden corregirse simultáneamente.
3. Riesgo de cierre fisiario permanente, acortamiento; los resultados no son previsibles.
4. Definitiva, transitoria.
5. Queda condicionada a la edad del paciente:

* Cirujana Ortopedista/Traumatóloga con Subespecialidad en Ortopedia y Traumatología Pediátrica. Médico Especialista en el Servicio de Ortopedia Pediátrica en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Ciudad de Guatemala.

Dirección para correspondencia:
Dra. Ana Zambrano
Edificio Verona, 1^{er} Nivel, Clínica 112, Centro de Especialidades Pediátricas
Segunda Calle «A» 6-28 zona 10, 01010, Ciudad de Guatemala
Correo electrónico: draanazambrano@yahoo.com.mx

Este artículo puede ser consultado en versión completa en <http://www.medigraphic.com/orthotips>

Fisis normales en niños mayores de 10 años: grapas o placas en ocho.

Fisis patológicas menores de 10 años: placa en ocho.

Obesos: placa en ocho con tornillos macizos.

Niños cercanos al final de crecimiento: grapas de Blount.

BIBLIOGRAFÍA

1. Díaz-Sarabia Azcárate C, Aspichueta Larruscain P, Morillo Gotor E, Ayuso Sáinz J. Estudio clínico y tratamiento del *genu-valgum* por epifisiodesis temporal con grapas de Blount. *Rev Esp de Cr Ost.* 1986; 21: 87-95.
2. Goyeneche R, Miscione H. Corrección de los despejes en la infancia mediante la modulación del crecimiento. *Rev Asoc Arent Ortop Traumatol.* 2010; 75: 317-320.