



Preguntas 61 a 70 y respuestas de la autoevaluación anterior (51 a 60)

61. A la hemorroidectomía de Park's se le conoce también como la hemorroidectomía submucosa o hemorroidectomía "reconstructiva". Se le da este último nombre por cuanto en la técnica se realiza ¿cuál de los siguientes procedimientos...?
- a) extirpación adecuada de mucosa superior con los vasos hemorroidales y se cubre el esfínter interno con la mucosa "escamosa" que estaba desplazada
 b) hemorroidectomía submucosa con exéresis del epitelio glandular y escamoso en forma amplia
 c) fijación de la mucosa "columnar" al esfínter interno con resección total de los "mariscos hemorroidales"
 d) hemorroidectomía subtotal con preventión y drenaje externo de puentes cutáneo mucosos
 e) ninguno de los anteriores
62. Señale mediante flechas la relación de la técnica quirúrgica de las siguientes hemorroidectomías, con el procedimiento básico que se realiza:
- | | |
|----------------------|--|
| A) Milligan y Morgan | 1) Ligadura y escisión |
| B) Lentini | 2) Hemorroidectomía submucosa reconstructiva |
| C) Park's | 3) Hemorroidectomía mediante asa de polipectomía |
| D) Lawrence | 4) Resección total y plastia a puntos sueltos |
| E) Ladle-Block | 5) Plastia posterior por deslizamiento |
| F) De los Ríos | 6) Anorrectoplastia |
- Respuestas?
- | | |
|----|---|
| A) | 1 |
| B) | 2 |
| C) | 3 |
| D) | 4 |
| E) | 5 |
| F) | 6 |
63. La anorrectoplastia es un procedimiento quirúrgico que se lo debe utilizar en ciertos procesos hemorroidales, en especial cuando no exista una patología anal florida, cuando las hemorroides no estén asociadas ni complicadas con: fisuras, criptitas, papilitis, abscesos retrofisurarios, pequeñas fistulas subcutáneo mucosas u orificios endo-anales de un fístula
- Verdadero
 Falso
64. La anorrectoplastia como procedimiento quirúrgico de una patología hemoroidal complicada, se la hace en un 70% en:
- a) Hemiano anterior
 b) Hemiano posterior
 c) Hemiano lateral izquierdo
 d) Hemiano lateral derecho
65. Las heridas posoperatorias de hemorroidectomías que abarquen toda la circunferencia del ano, como complicación conducen a:
- a) prurito anal crónico
 b) estenosis e incontinencia sensitiva
 c) estreñimiento crónico
 d) glerosis
 e) proctalgias y fisuras
 f) todas las anteriores
 g) ninguna de las anteriores
66. La esfinterotomía anal subcutánea lateral interna, descrita por "Notaras" en 1956 es un procedimiento muy útil que se utiliza únicamente en el tratamiento de la fisura anal crónica
- Falso
 Verdadero
67. La principal complicación posoperatoria media- ta del paciente hemorroidectomizado con la técnica del asa de alta frecuencia es:



- a) la retención urinaria
 b) al dolor al defecar
 c) el dolor posoperatorio inmediato
 d) la hemorragia
 e) la estenosis
 f) las recidivas
 g) ninguna de las anteriores
68. Todas la siguientes son las ventajas descritas por Lentini (1982), en lo que se refiere a la hemorroidectomía mediante el asa de alta frecuencia exceptuando un..... señale la falsa:
- a) sencillez en su realización
 b) cicatrización más rápida de las heridas
 c) rapidez en la ejecución
 d) mínima efusión de sangre
 e) posoperatorio con mínimas molestias
 f) completa extirpación hemoroidal por lo que las recidivas son nulas
 g) no se precisa controles diarios
 h) no se realizan tactos antes de los treinta días
 i) pronto movilización del enfermo
69. La retracción máxima de la mucosa que se produce al mes o dos meses de la hemorroidectomía mediante el asa de alta frecuencia, nos

indicará mediante tacto realizado en este tiempo: la presencia o ausencia de estenosis. Si bien ésta se presenta directamente proporcional a la cantidad de mucosa reseca y al tamaño de los puentes en ciertos pacientes puede presentarse así se hayan tomado todas las precauciones y previsiones. En estos casos y de necesitarse tratamiento médico para estas estenosis, utilizamos los siguientes procedimientos excepto uno.....señálelo:

- a) Dilatación con tallos de Hegar
 b) Laserterapia con equipos de He-Neón
 c) Uso de pomadas tópicas con esteroides
 d) Empleo de corticoides por vía oral
 e) Diatermia local
 f) Infiltraciones con hidrocortisona soluble
70. Los eczemas y las micosis perianales son cada vez más frecuentes luego de operaciones rectales o poshemorroidectomías en las que se usa electrocauterios o electrocoagulaciones. Pero son patologías de fácil control y tratamiento.
- Verdadero
 Falso

Respuestas de autoevaluación pasada de la 51 a la 60

- | | |
|--------------|-----------|
| 51.a | 56. e |
| 52.a | 57. a |
| 53.c | 58. A – 1 |
| 54.verdadero | B – 2 |
| 55.c | C – 3 |
| | 59.c |
| | 60.c |