



CARTA AL EDITOR

COMENTARIOS
DEL DR. CICERO AL DR. SANTILLÁN

En el excelente trabajo del Dr. Patricio Santillán (Tumores mediastinales. RIC 2006; 58: 245-253) el caso con un tumor retroesternal, ilustrado en la figura 1, con radiografía AP de tórax interpretada como normal y con TC que demuestra tumor, conviene considerar que pudo haberse diagnosticado con una simple radiografía lateral, que es un estudio clásico,¹ no mencionado en el texto, que suministra datos básicos sobre la localización de los tumores mediastinales y puede ser interpretado de acuerdo al esquema de la figura 2. La TC es un método de imagen de utilidad bien establecida,² sin embargo, la RMN permite la localización espacial de las masas del mediastino basada en las proyecciones axial, coronal y sagital, aunque ha sido superada en precisión por la tomografía computada helicoidal en tres

dimensiones. Estos estudios están indicados cuando se requiere información adicional.

REFERENCIAS

1. Felson B. Chest roentgenolgy. Philadelphia: WB Saunders; 1973, p. 419.
2. Hammond ZT, Liptay MJ. Middle mediastinum. En: Sabiston & Spencer Surgery of the Chest. 7a. Ed, Selke FW, del Nido PJ, Swanson SJ (eds.). Philadelphia: Elsevier Saunders; 2005, p. 682.
3. Singhal D, Kaiser LB. The posterior mediastinum. Ibid 2. p. 689.
4. Von Schul Thess GK, Mc Murdo K, Sholakoff D, et al. Mediastinal masses: MR imaging. *Radiology* 1986; 158: 259-96.
5. Cicero R, Criales JL, Cardoso JM, et al. Tomografía axial computada y resonancia magnética nuclear en patología del mediastino. *Rev Mex Radiol* 1993; 47: 7-14.

Atentamente,

Dr. Raúl Cicero
Cirujano Emérito. INCMSZ
Facultad de Medicina. UNAM

www.medigraphic.com