

Regimen inicial de terapia antirretroviral en pacientes adultos vírgenes a tratamiento

Montes de Oca-Morales Melva Guadalupe^a, Mercado-Núñez Emmanuel^a

Regimen inicial de terapia antirretroviral en pacientes adultos vírgenes a tratamiento

	A	B	Observaciones
	INTR ¹		
	Nevirapina Efavirenz	Tenofovir/Emtricitabina Tenofovir/Emtricitabina o Abacavir/Lamivudina	Tenofovir/Emtricitabina 300/200 mg qd co-formulado Abacavir/Lamivudina 600/300 mg co-formulado Tenofovir/Emtricitabina/Efavirenz co-formulado
Recomendado	IP ² reforzado con ritonavir (r)		
	Atazanavir/r Lopinavir/r Darunavir/r	Tenofovir/Emtricitabina o Abacavir/Lamivudina	Atazanavir/r 300/100 mg qd Lopinavir/r 400/100 mg ó 800/200 mg qd Darunavir/r 800/100 mg qd
	IP ³		
	Raltegravir	Tenofovir/Emtricitabina	Raltegravir 400 mg bid
Alternativo	Maraviroc Fosamprenavir/r Saquinavir/r	Didanosina/lamivudina o emtricitabina Zidovudina/lamivudina	Saquinavir/r comenzar con 500/100 mg y después de 1 semana cambiar a 1000/100 mg bid* Fosamprenavir/r 700/100 mg bid ó 1400/200 mg qd Maraviroc 150 mg bid si se combina con IP's, 300 mg bid si se combina con nevirapina, efavirtida, tipranavir/r ó 600 mg bid si se combina con efavirenz y etravirina ^{2,4} Zidovudina/lamivudina 300/150 mg bid co-formulado
Embarazo³	Lopinavir/r	Zidovudina/lamivudina	Lopinavir/r 400/100 mg bid durante el 1er trimestre y posteriormente cambiar a dosis 600/150 mg bid Zidovudina/lamivudina bid

Bibliografía:

The European AIDS Clinical Society (EACS) Guidelines version October 2011
Samantha Abel, Timothy M Jenkins, et al. Effects of CYP3A4 inducers with and without CYP3A4 inhibitors on the pharmacokinetics of maraviroc in healthy volunteers. *Br J Clin Pharmacol* 2008;65:38-46
Laura E. Rieley, Sigal Yawetz. Case 32-2005: A 34-year-old HIV-positive woman who desired to become pregnant. *N Engl J Med* 2005;353:16
Kevin C Brown, Sunita Paul, et al. Drug interactions with new and investigational antiretrovirals. *Clin Pharmacokinet* 2009;48(4):211-241.

Selecciona 1 fármaco de la columna A más 1 INTR⁴ de la columna B.

1, Inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa. 2, Inhibidor de proteasa. 3, Inhibidores de integrasa. 4, Inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa

* Esta recomendación es para vigilancia de prolongación de segmento QT por los efectos electrocardiográficos que puede provocar el fármaco.



a. Médico Pasante en Servicio Social asignado a COESIDA/Unidad de VIH, Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde. Universidad de Guadalajara. Hospital Civil de Guadalajara. Calle Hospital 278, depto. Unidad de VIH/SIDA. Colonia El Retiro. CP. 44280. Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono: 3315763600. Contacto al correo electrónico: Melva Guadalupe Montes de Oca Morales mel.mdom@gmail.com.
Montes de Oca-Morales MG, Mercado-Núñez E. Régimen inicial de terapia antirretroviral en pacientes adultos vírgenes a tratamiento. *Rev Med MD* 2011; 3(2):136.