



Escleromalacia perforante

Castellanos-Franco Tania Elizabeth, Saucedo-Rodríguez Laura Ray



Descripción de la imagen

Se trata de paciente masculino de 69 años de edad el cual acude a nuestro servicio en el mes de diciembre 2016 refiriendo visión borrosa de un año de evolución, conocido previamente con el diagnóstico de artritis reumatoide en tratamiento con hidroxicloroquina a dosis no especificada con regular apego al tratamiento de la patología de base. Se decide pase a quirófano para colocación de parche escleral presentando resultados satisfactorios en su momento; sin embargo al acudir a sus citas subsecuentes de control presenta en marzo 2017 presenta a la exploración oftalmológica agudeza visual OD: 20/100 OI: 20/20 presión intraocular OD: 10 mm hg OI: 12 mm hg , en ojo derecho presenta nuevamente un adelgazamiento importante del tejido escleral en sector temporal superior de 5 mm de alto por 9 mm de ancho con adelgazamiento de los vasos episclerales así como la herniación de tejido uveal, además de presentar hiperemia en el resto

del tejido conjuntival.

Referencias bibliográficas:

1. Parada Vásquez RH, et al. Escleromalacia perforante. *Rev Mex Oftalmol*. 2016.
2. Sol Inés Parapar-Tena, et al. Aplicación de suero autólogo al 100% en la escleromalacia perforante *Rev Mex. Oftalmol*. 2011; 85(2)

Unidad Oftalmológica de Alta Especialidad "Pablo Jiménez Camarena"
Hospital Civil de Guadalajara,
Guadalajara, MX

Autor para correspondencia
Tania Elizabeth Castellanos Franco, Unidad Oftalmológica de Alta Especialidad "Pablo Jiménez Camarena" Hospital Civil de Guadalajara. Hospital 278. Col. El Retiro, Guadalajara, Jalisco, México.
Contacto al correo electrónico:
castellanos.franco.tania@gmail.com