

Eritema pigmentado fijo

Gay-Muñoz Paulina Mariel^a, López-Padilla Sergio Oswaldo^b



Presentación del caso

Se presenta caso de paciente femenino de 34 años de edad quien acudió a valoración por presentar manchas violáceas redondeadas en mejilla derecha, labio superior e inferior de boca 20 días previos a la evaluación (Figuras 1 y 2). Como antecedente, refirió consumo reciente de Diclofenaco como tratamiento para cefalea. En la exploración no se documentó compromiso de mucosas ni síntomas de afectación general, por lo que se diagnosticó Eritema pigmentado fijo (EPF).

El EPF se manifiesta como manchas eritematosas o violáceas, ovaladas bien definidas, que aparecen posterior a la ingesta de medicamento, por lo que es también llamada erupción fija por drogas. Las lesiones tienen una duración de varios días y pueden evolucionar a vesículas y/o ampollas. Al remitir dejan una pigmentación residual azul-grisácea y se presentarán en el mismo sitio cada vez que se ingiera el medicamento causante.¹

El EPF ocurre con mayor frecuencia en mujeres, en la tercera década de la vida, afecta por lo general miembros superiores, miembros inferiores, genitales, tronco y cara. Puede presentarse asociado a múltiples medicamentos, especialmente AINES y sulfas. El más frecuentemente relacionado es Trimetoprim con Sulfametoxazol.² En su patogénesis se encuentra

una reacción citotóxica mediada por células contra los queratinocitos de la epidermis; se han encontrado células T de memoria CD8 en las lesiones que aparentemente contribuyen a la memoria inmunológica y su reactivación ante una re-exposición al fármaco inductor.³

Referencias bibliográficas:

1. Lee AY, "Fixed drug eruptions, Incidence, recognition, and avoidance, *Amer J Clin Dermatol* 2000;1: 277-285.
2. Kavoussi H, Rezaei M, Derakhshandeh K, Moradi A, Ebrahimi A, Rashidian H, et al. Clinical features and drug characteristics of patients with generalized fixed drug eruption in the west of Iran (2005-2014). *Dermatology Research Practice* 2015.
3. Tekely E., Kadziela WG, Chodorowska G. Fixed drug eruption-pathogenesis and diversity of clinical manifestations. *Przeglad Dermatologiczny*, 2012; 99:252-253.

^a Medicina General. División de Medicina del Hospital Ángeles León.

^b Dermatólogo. Jefe de la División de Medicina del Hospital Ángeles León. Hospital Ángeles León.

Autor para correspondencia:

Dr. Sergio Oswaldo López Padilla; Dermatólogo; Adscrito a la división de Medicina del Hospital Ángeles León; Av. Cerro Gordo 311, Lomas del Campestre, León, Guanajuato, México. C. P. 37150; Teléfono: 477-788-5600 Ext. 3810. Correo electrónico: sergiolopez@angelesleon.com