

Hemangioma capilar retiniano

Retinal capillary hemangioma

Jorge A. Sánchez-Ramos^{1*} y Juan A. Ramírez-Estudillo²

¹Médico adjunto, Departamento de Retina y Vítreo; ²Jefe del Departamento de Retina y Vítreo. Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, Ciudad de México, México

Femenino de 50 años, con antecedentes familiares de tumoraciones no especificadas. Inicia su padecimiento con baja visual y metamorfopsias de 2 meses de evolución en el ojo izquierdo y se encuentran múltiples lesiones vasculares en la retina por lo que se inicia protocolo de estudio para Von-Hippel-Lindau (Fig. 1).

Financiamiento

Los autores no recibieron patrocinio para llevar a cabo este artículo.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.



Figura 1. Composición fotográfica del fondo de ojo izquierdo en donde se observan múltiples lesiones vasculares con exudación importante en algunas de ellas con afección parcial de la zona foveal.

Correspondencia:

*Jorge Arturo Sánchez-Ramos

E-mail: jorgesr84@hotmail.com

0187-4519/© 2017 Sociedad Mexicana de Oftalmología. Publicado por Permanyer México SA de CV. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Fecha de recepción: 12-01-2017

Fecha de aceptación: 20-01-2017

DOI: 10.1016/j.mexoft.2017.01.003

Disponible en internet: 25-02-2017

Rev Mex Oftalmol. 2019;93(2):110

www.rmo.com.mx