

Cartas al Editor

Rev. Mex. Anest
1999;22:222
©, Soc. Mex. Anest, 1999

Prácticas transfusionales entre anestesiólogos: I. Resultados de su aplicación en dos años diferentes, 1996 y 1998. Moyao-García D, Nava-Ocampo AA. Rev Mex Anest 1999;22:76-84. Correcciones.

Estimado Editor:

Recientemente, publicamos dos artículos relacionados con la aplicación de una encuesta entre anestesiólogos mexicanos para identificar sus prácticas transfusionales. En el primer artículo¹ aparecen tres cuadros en los que los autores identificamos seis comparaciones entre la encuesta aplicada en 1996 y la de 1998 que erróneamente fueron señaladas por nosotros los autores como no significativas. En el cuadro anexo, se muestran estas comparaciones y se señala la presencia de diferencias estadísticamente significativas. Lamentamos enormemente tales errores cometidos durante un extenuante análisis de los datos. Aunque estos cambios afectan las consideraciones particulares expresadas en el artículo, no modifican el sentido general de la discusión o de las conclusiones.

Diana Moyao-García
*Departamento de Anestesia, Terapia Respiratoria y Clínica del Dolor
Hospital Infantil de México "Federico Gómez"
Secretaría de Salud.*

Alejandro A. Nava-Ocampo
*Unidad de Investigación Médica en Farmacología
Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional "Siglo XXI"
Instituto Mexicano del Seguro Social
México D.F.
México*

REFERENCIA

1. Moyao-García D, Nava-Ocampo AA. Prácticas transfusionales entre anestesiólogos: I. Resultados de su aplicación en dos años diferentes, 1996 y 1998. **Rev Mex Anest** 1999;22:76-84.

Cuadro. Prácticas transfusionales entre anestesiólogos

	1996 (n= 214) n (%)	1998 (n= 243) n (%)
Tiempo de práctica anestesiológica (años)		
5-20	151 (70.6)	140 (57.6)*
Pacientes pediátricos que atiende durante su práctica diaria (%)		
Ninguno	8 (3.7)	22 (9.1)*
Durante los procedimientos quirúrgicos con pérdida de sangre, cuál de las siguientes opciones describe mejor su conducta?		
En el paciente adulto		
Transfundir sólo si presentan cambios significativos en la TA o FC	13 (6.6)	5 (2.4)*
En cual de las siguientes condiciones administraría PFC		
En el paciente adulto		
Sólo en presencia de estudios de coagulación alterados	86 (43.7)	75 (35.4)*
Datos clínicos de hipovolemia		
Sangre total	84 (42.6)	70 (33.0)*
Otros	14 (7.1)	33 (15.6)*

* $p < 0.05$, encuesta de 1996 vs 1998 (prueba de χ^2)